

# Kaltbrunner Riet

## Ornithologischer Bericht 2003 bis 2007

Hanspeter Geisser, Koni Felix, Lilly Felix, Jean-Marc Obrecht, Stefan Röllin, Andreas Täschler & Klaus Robin





Für diesen Fünf-Jahresbericht haben wir die Informationen des ersten Berichts 2003 bis 2005 mit den Jahren 2006 und 2007 ergänzt. Auf die Erstellung von Grafiken haben wir verzichtet, ebenso auf die Nennung des Status betr. Brutverhalten der einzelnen Arten. Obwohl diese Zuordnung von verschiedenen Kommentatoren des Berichts 2003-2005 gewünscht worden war, muss darauf hingewiesen werden, dass in der Fünf-Jahresperiode nur im Jahr 2004 eine Revierkartierung vorgenommen worden ist und wir die Daten der übrigen Jahre als zu heterogen betrachten, um sie nach Atlaskriterien einheitlich zu bewerten. Der nächste Bericht wird voraussichtlich die Jahre 2003 bis 2012 umfassen. Bis dahin soll es der hier vorliegende Bericht erlauben, sich ornithologisch zu orientieren. Neu haben wir sämtliche lateinische Artnamen eingefügt mit dem Ziel, dass auch die anderssprachigen Ornithologinnen die für sie wichtigen Artinformationen finden, wenn sie eine Beobachtungstour durch das Kaltbrunner Riet planen. Im Gegenzug wünschen wir uns, dass auch diese Besucher ihre Informationen über ornitho.ch zugänglich machen. Die Artenreihenfolge richtet sich nach Maumary L. Valloton L und Knaus P. 2007: Die Vögel der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte, Sempach, und Nos Oiseaux, Montmollin.

Wiederum danke ich allen BeobachterInnen, die am Gelingen dieser Übersicht mitgewirkt haben. Sollten einzelne BeobachterInnen, deren Daten wir über die Schweizerische Vogelwarte, Sempach, zur Darstellung bekommen haben, hier nicht erwähnt sein, ersuchen wir um Nachsicht und hoffen, dass sie sich auch in diesem Fall nicht davon abhalten lassen, weiterhin zu beobachten und ihre Beobachtungen zur Verfügung zu stellen. Ein besonderer Dank geht an das Autorenteam, dem die regelmässigsten MelderInnen angehören. Dann ist speziell Hanspeter Geisser für seinen nimmermüden Einsatz beim Sammeln und Aufbereiten der Daten zu danken. Ein grosser Dank geht an Hans Schmid, Schweizerische Vogelwarte, Sempach, für die Auszüge aus den Datenbanken idext und ornitho.ch und an Jean-Marc Obrecht für die grafische Bearbeitung des Berichts.

## **Insgesamt wurden zwischen 2003 und 2007 im Kaltbrunner Riet und seiner unmittelbaren Umgebung 217 Vogelarten beobachtet.**

Klaus Robin, Leiter der Pro Natura Geschäftsstelle für das Benkner, Burger und Kaltbrunner Riet - 2003 bis 2010.

In diesem Bericht sind Meldungen der folgenden Personen verarbeitet worden:

Alig Markus, Anderegg Kurt, Bächtiger Martina, Baumann A., Baumberger Claudia, Baumgartner Albert, Beerli Christian, Bieler-Tschümperlin Thomas, Borgula Adrian, Bösch Bruno, Bruder Arthur, Brändli Paul J., Burkhardt Marcel, Burnand Jacques, Dössegger Hans-Ueli, Ebnetter Gallus, Ehrengreuber Markus, Fehr Christine, Felix Koni & Lilly, Gächter Marcel, Gasser K., Geiger Walter, Geisser Hanspeter, Gerber Martin, Gfeller Hans, Grawehr Arthur, Greminger Werner, Grether Edgar, Gyr Edith, Hauri Rolf, Hauser/Schuppisser, Hofer Martin, Honegger René, Hotz Manuel, Huber Alois, Hüppin Leo, Imhof Bruno, Iten Dominik, Jäggi Kuno, Keist Lotti & Bruno, Keller Toni, Kleiner Philipp, Klopfenstein Hannes, Knaus Peter, Kohli Stefan, Kubli Patric, Kühne Pius, Kuinz Guido, Kunz Rolf, Kurmann Silvio, Kurz Felix, M. S., Marques David, Matter Franziska, Meier-Freiburghaus Lotti, Meister Brigitte & Jürg, Mettler Kaspar, Meyer Susanna, Mö, Mollet Pierre, Neracher Hans, Noser Rolf, Oberhänsli Waltraud, Obrecht Jean-Marc, Pischel Constantin, Rey Emmanuel, Robin Klaus, Röllin Stefan, Rüegg Albert, Rutz Winnie, Sc, Schibli Martin, Schmid Hans, Schmid Werner, Schmidt Doris & Peter, Schmucki Paul, Schneeberger Anita, Scussel Manuel, Sigg Fritz, Spiess Martin, Stahel Thomas, Straubhaar Michael, Stricker Simon, Stutz Stefan, Suter Maja & Fritz, Täschler Andreas, Thöni Lotti, Trinkler Sirio, V. S., Weber Roland, Weiss André, Widmer Eric, Witt Mike, Zanola Werner, Zanolli Mario,

### **Zitervorschlag**

Geisser H., Felix K., Felix L., Obrecht J.-M., Röllin S., Täschler A. & K. Robin. 2010. Kaltbrunner Riet - Ornithologischer Bericht 2003 bis 2007. © Pro Natura SGA, St. Gallen; Fachkommission für das Benkner, Burger und Kaltbrunner Riet, Uznach; Schweizerische Vogelwarte, Sempach; Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, Wädenswil. Typoscript; pp. 22.

Titelfoto: Braunkehlchen auf dem Herbstzug © Klaus Robin

Schlussfassung; 28. November 2010/kr

### **Bezug der gedruckten Fassung**

Pro Natura  
Geschäftsstelle für das Benkner, Burger und Kaltbrunner Riet  
Ernetschwilerstrasse 34  
CH-8730 Uznach  
info@robin-habitat.ch

oder

Fachstelle für Wildtier- und Landschaftsmanagement WILMA  
Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen  
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW  
Postfach  
CH-8820 Wädenswil  
klaus.robin@zhaw.ch

pdf-Version über Internet

<http://www.pronatura.ch/sg>



**Zwergtaucher** *Tachybaptus ruficollis*

- 2003: ganzjährig anwesend; am 29. Juni die ersten Jungvögel  
2004: ganzjährig anwesend; am 9. Juni die ersten Jungvögel; eine Revierkartierung ergibt 4 Paare  
2005: ganzjährig anwesend; bis ca. 20 Ind. im Januar und Februar; am 14. Juli die ersten Jungvögel, mindestens 5 Familien  
2006: ganzjährig anwesend; am 29. Juni die ersten Jungvögel; mindestens 5 Familien Mitte August  
2007: ganzjährig anwesend; am 20. Juni der erste Jungvogel

**Haubentaucher** *Podiceps cristatus*

- 2003: im Juli, September und Oktober je eine Beobachtung von 1 Ind.  
2004: von April bis Dezember 7 Beobachtungen von 1-2 Ind.  
2005: im Februar und März je eine Beobachtung von 1 Ind.  
2006: von Mitte März bis Anfang August 8 Beobachtungen von 1 - 10 Ind.  
2007: Beobachtungen von Januar bis April; Juni bis August und im Dezember an 21 Tagen 1 - 3 Ind.

**Schwarzhalstaucher** *Podiceps nigricollis*

- 2003: von Ende März bis Anfang September regelmässig anwesend; 2 erfolgreiche Bruten  
2004: von Mitte April bis Ende Juni 1 Ind., im Mai 2 mal 2 Ind.; keine Brut; am 20. Juli nochmals 1 Ind.  
2005: von Anfang April bis Mitte September, anfangs 3 bis 4, später noch 2 Altvögel anwesend; mindestens 2 erfolgreiche Bruten (ev. Schachtelbrut)  
2006: Anfang April und von Anfang Mai bis Anfang Juli regelmässig 1 - 2 Ind., am 7. Mai 3 Ind.; keine Hinweise auf eine Brut  
2007: am 18. März 1 Ind., dann von Anfang April bis Anfang August regelmässig Beobachtungen bis zu 3 Adulte; am 18. Juni erstmals ein Paar mit 3 Jungvögeln, dazu ein weiterer Adulte; eine sichere Brut

**Kormoran** *Phalacrocorax carbo*

- 2003: von März bis Mai und September bis Oktober an 17 Tagen 1-3 Ind.  
2004: von März bis April und September bis Dezember an 22 Tagen 1-6 Ind.; am 11. Oktober überfliegen zirka 100 Richtung Südost  
2005: von Januar bis Anfang April und August bis Dezember an 21 Tagen bis zu 5 Ind.  
2006: von Anfang Januar bis Ende April und Ende August bis Mitte Dezember an 24 Tagen bis zu 14 Ind.  
2007: von Anfang Januar bis Mitte Mai und Ende Juli bis Ende Jahr an 30 Tagen bis zu 28 Ind.

**Rohrdommel** *Botaurus stellaris*

- 2003: vom 10. März bis 10. Mai an 16 Tagen je 1 Ind., am 13. April 2 Ind.; einzige Herbstmeldung: am 12. September 1 Ind.  
2004: vom 14. März bis 1. April 4 Beobachtungen von 1 Ind., am 25. November eine weitere Beobachtung von 1 Ind.  
2005: vom 16. März bis 14. April an 8 Tagen je 1 Ind.; eine Herbstbeobachtung: 1 Ind. am 2. September  
2006: vom 14. - 17. April 1 Ind.; dann am 22. August und 23. November je 1 Ind.  
2007: am 10. und 21. März je 1 Ind.

**Zwergdommel** *Ixobrychus minutus*

- 2003: von Ende Mai bis Mitte Sept. bis zu 3 Altvögel; wahrscheinlich 1 bis 2 Bruten  
2004: von Mitte Mai bis Anfang September bis zu 3 Altvögel; mindestens eine Brut

- 2005: von Mitte Mai bis Mitte September regelmässig bis zu 5 Altvögel; sicher eine, wahrscheinlich 2 erfolgreiche Bruten  
2006: am 17. April 1 Ind.; dann vom 24. Mai bis Ende August regelmässig bis zu 3 Adulte; ab dem 1. August mehrmals 1 Jungvogel; mindestens 1 Brut  
2007: vom 9. Mai bis 5. September 1 - 3 Ind.; ab dem 19. Juli mehrmals 1 Jungvogel; mindestens 1 Brut

**Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax*

- 2003: von Ende April bis Anfang Juni an 5 Tagen bis zu 4 Ind., im September an 3 Tagen je 1 Ind.  
2004: von Ende April bis Anfang Juni an 6 Tagen 1-2 Ind., im August an 3 Tagen 1-3 Ind.  
2005: von Anfang April bis Ende Mai an 15 Tagen 1-5 Ind.; am 28. Juni ein Altvogel und am 6. Juli 3 noch nicht lange flügge Diesjährige (Brut?); dann von Anfang August bis Anfang September an 5 Tagen 1-2 Ind.  
2006: von Ende April bis Ende Mai an 3 Tagen je 1 Ind. und von Mitte Juli bis Ende August an 7 Tagen 1 - 2 Ind.  
2007: von Anfang April bis Mitte Mai an 5 Tagen bis zu 5 Ind.; Mitte Juli 1 Ind. und Ende August an 5 Tagen 1 - 2 Ind.

**Rallenreiher** *Ardeola ralloides*

- 2003: keine Meldung  
2004: am 9. Mai und vom 19. bis 27. Mai je 1 Ind.  
2005: 1 Ind. am 29. Mai  
2006: keine Meldung  
2007: am 31. Mai 1 Ind.

**Seidenreiher** *Egretta garzetta*

- 2003: von Mitte April bis Anfang Juni an 6 Tagen bis maximal 7 Ind.  
2004: von Anfang April bis Ende Mai an 12 Tagen meist 1-2 Ind., am 27. Mai 4 Ind.  
2005: am 15. April, 14., 22. und 23. Mai je 1 Ind.  
2006: vom 21. April bis 2. Mai an 4 Tagen je 1 Ind. und am 18. Juni 3 Ind.  
2007: Beobachtungen an 3 Tagen: am 26. April 2 Ind., am 9. Mai 1 Ind. und am 13. Mai 7 Ind.

**Silberreiher** *Egretta alba*

- 2003: von Mitte März bis Anfang Juni an 39 Tagen bis 9 Ind. und von Ende August bis Mitte Dezember an 19 Tagen 1-2 Ind.  
2004: anfangs Januar 1 Ind., dann von Ende März bis Anfang Mai an 19 Tagen bis 6 Ind. und von Anfang August bis Ende Jahr an 8 Tagen bis zu 4 Ind.  
2005: Ende Januar 1 Ind.; dann von Anfang März bis Ende Mai meist 1-9 Ind., am 27. März 16 Ind. und am 31. März sogar 19 Ind. anwesend; von Mitte September bis Ende Dezember wieder regelmässig bis zu 5 Ind.  
2006: von Anfang Januar bis Ende Mai an 18 Tagen bis zu 12 Ind., am 4. April 16 Ind.; dann von Anfang September bis Ende Dezember an 19 Tagen bis zu 6 Ind.  
2007: von Anfang Januar bis Anfang Juni an 54 Tagen bis zu 8 Ind., am 14. März 14 Ind.; dann von Anfang August bis Ende Dezember an 33 Tagen bis zu 9 Ind.

**Graureiher** *Ardea cinerea*

- 2003: ganzjährig anwesend  
2004: ganzjährig anwesend  
2005: ganzjährig anwesend; bis zu 41 Ind. am 14. Juli  
2006: ganzjährig anwesend; bis zu 40 Ind. am 9. Juli  
2007: ganzjährig anwesend; bis zu 24 Ind. am 5. April

**Purpurreiher** *Ardea purpurea*

- 2003: von Mitte April bis Anfang Juni an 8 Tagen 1-3 Ind.  
2004: von Mitte April bis Mitte Juni an 31 Tagen bis zu 7 Ind.  
2005: von Ende April bis Ende Mai an 8 Tagen 1 bis 2 Ind.; eine Herbstbeobachtung: 1 Ind. am 19. September  
2006: von Mitte April bis Mitte Juni an 24 Tagen bis zu 3 Ind.; im August an 2 Tagen je 1 Ind.  
2007: von Ende April bis Mitte Juni an 10 Tagen bis zu 3 Ind.; keine Herbstbeobachtung

**Schwarzstorch** *Ciconia nigra*

- 2003: im März und Juni je eine, im August 2 Beobachtungen von je 1 Ind.  
2004: einzige Meldung: 1 Ind. am 29. August  
2005: am 21. Mai 1 Ind.; von Mitte Juli bis Ende September an 11 Tagen 1-2 Ind., am 27. September 3 Ind.  
2006: am 21. April, 24. Mai und 18. Oktober je 1 Ind., am 5. September 2 Ind.  
2007: am 17. August und am 10. Oktober je 1 Ind.

**Weisstorch** *Ciconia ciconia*

- 2003: ganzjährig anwesend  
2004: fast ganzjährig anwesend  
2005: ganzjährig anwesend; maximal 56 Ind. am 25. August; 2 Bruten im Raum Pumpwerk Grynau  
2006: von Mitte Februar bis Ende November regelmässig anwesend; maximal 37 Ind. am 30. August  
2007: ganzjährig anwesend; maximal 31 Ind. am 29. August

**Löffler** *Platalea leucorodia*

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: keine Meldung  
2006: am 13. Mai 1 Ind. (K. Robin, R. Rohner, V. Sidler)  
2007: keine Meldung

**Höckerschwan** *Cygnus olor*

- 2003: ganzjährig anwesend, erste Beobachtung von 5 Jungvögeln am 9. Juni  
2004: fast ganzjährig anwesend, 1 Paar mit 4 Jungvögeln erstmals am 9. Juni  
2005: fast ganzjährig anwesend; 1 Paar mit 4 Jungvögeln erstmals am 9. Juni (während 3 Jahren das gleiche Datum)  
2006: fast ganzjährig anwesend; 1 Paar mit 7 Jungvögeln erstmals am 3. Juni  
2007: fast ganzjährig anwesend; 1 Paar mit 6 Jungvögeln erstmals am 28. Mai

**Saatgans** *Anser fabalis*

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: 3 Ind. am 19. März  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Graugans** *Anser anser*

- 2003: am 23. März 3 Ind., von Ende März bis Mitte April durchgehend 1 Ind.  
2004: Mitte April während 4 Tagen 1 Ind.  
2005: vom 26. März bis 4. April zuerst 3, dann 2, zum Schluss noch 1 Ind.  
2006: am 9. Mai 2 Ind.  
2007: keine Meldung

**Rostgans** *Tadorna ferruginea*

- 2003: im April an 2 Tagen bis 4 Ind.  
2004: von März bis September an 5 Tagen 1-2 Ind.  
2005: von Ende März bis Ende April bis zu 5 Ind., Mitte August an 3 Tagen 1 Ind. und im September an 3 Tagen 2 bis 3 Ind.  
2006: von Ende März bis Mitte April an 6 Tagen 2 - 4 Ind.  
2007: von Mitte März bis Ende April an 4 Tagen 1 - 2 Ind.; Mitte Oktober 1 Ind.

**Brandente** *Tadorna tadorna*

- 2003: am 24. Juni und vom 24. Juli bis 2. August je 1 Ind.  
2004: keine Meldung  
2005: am 12. April 1 Ind., am 7. Mai 4 Ind.; dann am 9. und 13. Mai wieder 1 Ind.  
2006: am 31. August 2 Ind.  
2007: am 4. April 1 Ind.

**Pfeifente** *Anas penelope*

- 2003: im Oktober und November je eine Beobachtung von 1-2 Ind.  
2004: Ende März 1 Ind., im Oktober bis Anfang November maximal 5 Ind.  
2005: Ende Oktober bis Ende Jahr an 6 Tagen 1-5 Ind.  
2006: Anfang Januar bis Anfang April an 3 Tagen 1 - 2 Ind. und Mitte September bis Mitte November an 8 Tagen bis zu 18 Ind.  
2007: Ende Januar bis Anfang April an 7 Tagen 1 - 2 Ind.; am 31. Mai 1 Ind. und von Anfang Oktober bis Anfang Dezember an 10 Tagen bis zu 22 Ind.

**Schnatterente** *Anas strepera*

- 2003: von Mitte März bis Ende Oktober regelmässig, in der übrigen Zeit nur vereinzelt Beobachtungen, maximal 25 Ind. am 2. Juli und 30. August  
2004: von Anfang März bis Mitte April und Anfang Juni bis Ende September regelmässig, in der übrigen Zeit nur vereinzelt Beobachtungen; maximal 40 Ind. am 28. August  
2005: ganzjährig anwesend, auch zur Brutzeit durchgehend Beobachtungen, jedoch keine Hinweise auf eine Brut; maximal 70 Ind. am 25. August  
2006: fast ganzjährig anwesend; zwischen dem 2. Mai und 10. Juni keine Meldungen; maximal 37 Ind. am 16. Juli  
2007: fast ganzjährig anwesend; zwischen dem 28. April und 31. Mai keine Meldungen; maximal 28 Ind. am 10. März

**Krickente** *Anas crecca*

- 2003: ganzjährig anwesend, in den Zugzeiten regelmässig, aus der übrigen Zeit nur wenige Beobachtungen; maximal 22 Ind. am 31. März  
2004: ganzjährig anwesend, ausserhalb der Zugzeit nur wenige Beobachtungen; maximal 50 Ind. am 14. Februar  
2005: fast ganzjährig anwesend; von Mitte Mai bis Ende Juni keine Beobachtungen; Ende August grosse Trupps mit bis zu 300 Ind. am 24. August  
2006: fast ganzjährig anwesend; Anfang Mai bis Mitte Juni keine Beobachtungen; am 19. September 136 Ind.!  
2007: ganzjährig anwesend; bis zu 40 Ind. am 29. Dezember

**Stockente** *Anas platyrhynchos*

- 2003: ganzjährig anwesend, Ende März bis zu 60 Ind.  
2004: ganzjährig anwesend, Mitte August bis zu 100 Ind.; eine Revierkartierung ergibt 8 Paare  
2005: ganzjährig anwesend; Anfang Juni bis zu 60 Ind.; mehrere Bruten  
2006: ganzjährig anwesend; am 25. September 420 Ind.; mindestens 1 Brut

2007: ganzjährig anwesend; Mitte Juli bis zu 100 Ind.; vereinzelt Bruten

#### **Spiessente** *Anas acuta*

2003: 2 Ind. am 2. November

2004: im März, August und Oktober je eine Beobachtung von 1-4 Ind.

2005: Anfang Januar 1 Ind., Ende März 4 Ind.; im Herbst Ende August bis Ende November an 6 Tagen 1-3 Ind.

2006: von Anfang Januar bis Mitte April an 17 Tagen 1 - 2 Ind.; Anfang Juli 1 Ind.; von Mitte September bis Mitte November an 13 Tagen 1 - 2 Ind.; am 25. September 27 Ind.

2007: in der 1. Märzhälfte an 8 Tagen bis zu 4 Ind.; Ende August und Anfang September je 1 Ind.

#### **Knäkente** *Anas querquedula*

2003: von Mitte März bis Ende Mai bis 11 Ind.; von Mitte August bis Anfang September an 3 Tagen je 1 Ind.

2004: von Mitte März bis Mitte Mai bis 10 Ind., von August bis Mitte September bis 12 Ind.

2005: vom 20. März bis 2. September fast durchgehend anwesend, keine Beobachtungen im Juni; Ende März und Ende August bis zu 40 Ind.

2006: vom 4. März bis 25. September fast durchgehend anwesend; maximal 15 Ind. am 25. März und 16 Ind. am 25. September

2007: vom 3. März bis 5. September fast durchgehend anwesend; maximal 33 Ind. am 4. April und 24 Ind. am 9. August

#### **Löffelente** *Anas clypeata*

2003: Anfang Februar bis Ende März und Ende August bis Anfang Dezember bis zu 9 Ind., einzige Brutzeitbeobachtung: 1 Ind. am 14. Juli

2004: im März, April und August bis November bis zu 12 Ind., im Juni und Juli vereinzelt

2005: von Mitte März bis Ende Oktober durchgehend Beobachtungen, keine Hinweise auf eine Brut; maximal 26 Ind. am 14. April

2006: von Anfang Februar bis Anfang Mai und Ende Juni bis Ende November; maximal 14 Ind. am 16. April und 17 Ind. am 25. September

2007: von Anfang Januar bis Ende April und Ende Mai bis Ende Jahr; maximal 13 Ind. Ende März und 10 Ind. Mitte Oktober

#### **Kolbenente** *Netta rufina*

2003: von Ende März bis Anfang September regelmässig anwesend, keine Hinweise auf eine Brut

2004: von Ende März bis Ende August regelmässig anwesend, maximal 16 Ind. am 7. Mai; mindestens eine Brut: am 22. August 2 Juvenile zusammen mit Reiherenten

2005: Mitte März bis Mitte August bis zu 26 Ind. (9. Juni); eine Brut: ab dem 24. Juni 1 Familie mit 8 Jungen

2006: anwesend von Anfang April bis Ende September; maximal 23 Ind. am 3. Juni; erste Jungvögel am 29. Juli; mindestens 3 Bruten

2007: anwesend von Anfang März bis Anfang September; maximal 19 Ind. am 27. Juni; ab dem 20. Juni mehrmals 1 Jungvogel in einer Reiherentenfamilie

#### **Tafelente** *Aythya ferina*

2003: von Ende Februar bis Ende April an 6 Tagen bis zu 10 Ind., in der übrigen Zeit nur eine Beobachtung: 1 Ind. am 14. Juli

2004: im März 3 und im Dezember 1 Beobachtung von 1-2 Ind.

2005: Ende Februar bis Anfang April an 11 Tagen bis zu 5 Ind. und Mitte Juli bis Ende August an 8 Tagen bis zu 4 Ind.

2006: Anfang Februar bis Ende März an 6 Tagen 1 - 4 Ind. und Anfang Juni bis Anfang November an 28 Tagen 1 - 4 Ind.

2007: Mitte Januar bis Anfang März an 6 Tagen bis zu 6 Ind. und Mitte Juli bis Ende August an 10 Tagen je 1 Ind.

#### **Moorente** *Aythya nyroca*

2003: keine Meldung

2004: keine Meldung

2005: 2 Ind. am 24. August

2006: keine Meldung

2007: keine Meldung

#### **Reiherente** *Aythya fuligula*

2003: Beobachtungen von Januar bis Oktober mit maximal 25 Ind.; mindestens 1 Brut

2004: fast ganzjährig anwesend, mehrere Bruten im Gebiet

2005: Anfang Januar bis Mitte Oktober bis zu 20 Altvögel; mehrere Bruten im Gebiet

2006: Mitte Februar bis Ende November durchgehend anwesend; bis zu 27 Ind. am 9. August; mehrere Bruten im Gebiet; erste Jungvögel am 7. Juli

2007: fast ganzjährig anwesend; Anfang März bis zu 40 Ind.; mehrere Bruten im Gebiet; die ersten Jungvögel am 20. Juni

#### **Bergente** *Aythya marila*

2003: keine Meldung

2004: keine Meldung

2005: 1 Ind. am 14. Mai

2006: keine Meldung

2007: keine Meldung

#### **Schellente** *Bucephala clangula*

2003: keine Meldung

2004: keine Meldung

2005: am 31. März und am 27. August je 1 Ind.

2006: am 20. März und am 13. Juni je 2 Ind.; Mitte Oktober bis Ende November an 5 Tagen je 1 Ind.

2007: Ende Januar an 2 Tagen und Anfang April bis Mitte Juni an 7 Tagen 1 - 3 Ind.; im Mai mehrmals ein balzendes Paar

#### **Gänsesäger** *Mergus merganser*

2003: im März 3 und im Oktober 1 Beobachtung von 1-7 Ind.

2004: in den Monaten Januar, Februar und Dezember je eine Beobachtung von 1-2 Ind.

2005: in den Monaten Januar bis Mai, September und Dezember an 12 Tagen 1-12 Ind.

2006: in den Monaten Januar bis Juni, Oktober und Dezember an 14 Tagen bis zu 10 Ind.; meist im Gebiet des Linthkanals

2007: an 5 Tagen Beobachtungen von je 2 Ind. im Gebiet des Linthkanals

#### **Schwarzkopfruderente** *Oxyura jamaicensis*

2003: keine Meldung

2004: keine Meldung

2005: keine Meldung

2006: keine Meldung

2007: am 9. Oktober 1 Männchen (M. Witt; von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission akzeptiert))

#### **Wespenbussard** *Pernis apivorus*

2003: je 1 Ind. am 11. und 25. Mai; einzige Beobachtung vom Herbstzug: 2 Ind. am 1. August

2004: einzige Beobachtung: 1 Ind. am 22. Mai

2005: Beobachtungen an 4 Tagen: je 1 Ind. am 6. und 14. Mai, 12 ziehende Ind. am 24. August und 2 Ind. am 24. September  
2006: am 11. Juni 1 Ind. und am 5. September 6 Ind.  
2007: am 10. September 1 Ind.

#### **Schwarzmilan** *Milvus migrans*

2003: erste Frühjahrsbeobachtung am 21. März, bis Ende Juni regelmässig bis zu 9 Ind., keine Meldungen aus der übrigen Zeit  
2004: erste Frühjahrsbeobachtung am 19. März, bis Mitte September regelmässig anwesend, maximal 14 Ind. am 29. Mai; am 22. Mai wurde 1 Ind. beim Horstbau beobachtet  
2005: erste Frühjahrsbeobachtung am 16. März, bis Ende August regelmässig, maximal 12 Ind. am 14. Juni; letzte Meldung: 2 Ind. am 19. September  
2006: erste Frühjahrsbeobachtung am 20. März; bis Ende August regelmässig anwesend; letzte Beobachtung am 2. Oktober; maximal 8 Ind. am 6. Mai  
2007: erste Frühjahrsbeobachtung am 21. Februar; von Mitte März bis Ende August regelmässig Meldungen bis 8 Ind.; letzte Beobachtung: 1 Ind. am 27. September

#### **Rotmilan** *Milvus milvus*

2003: von Ende Februar bis Anfang Dezember regelmässig anwesend, keine konkreten Bruthinweise  
2004: im Januar und Februar an 3 Tagen, ab Anfang März regelmässig anwesend bis Ende Jahr  
2005: 4 Januar- und 2 Februarbeobachtungen, dann ab Anfang März bis Anfang November regelmässig; eine Brut am Buechberg  
2006: Beobachtungen von Mitte März bis Ende November; maximal 20 Ind. am 2. Oktober  
2007: Beobachtungen von Ende Januar bis Ende Dezember; maximal 8 Ind. am 26. März

#### **Schlangenadler** *Circaetus gallicus*

2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: 1 Ind. am 14. Mai (K. Robin u. W. Zanola; von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission akzeptiert)  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

#### **Rohrweihe** *Circus aeruginosus*

2003: von Anfang März bis Mitte Oktober an 62 Tagen bis zu 5 Ind.; auch in den Sommermonaten regelmässig Beobachtungen  
2004: von Mitte März bis Ende Mai und Ende August bis Mitte Oktober bis zu 4 Ind.; keine Sommerbeobachtungen  
2005: von Mitte März bis Ende Mai und Mitte August bis Anfang Oktober an 45 Tagen bis zu 5 Ind.  
2006: von Mitte März bis Anfang Juni und Anfang August bis Mitte Oktober an 58 Tagen bis zu 6 Ind.  
2007: von Anfang März bis Anfang Juni und Ende August bis Mitte Oktober an 29 Tagen bis zu 3 Ind.

#### **Kornweihe** *Circus cyaneus*

2003: Ende März und Mitte April je 1 Ind.; von Mitte Oktober bis Mitte Dezember an 8 Tagen je 1 Ind.  
2004: Ende Januar an 2 Tagen je 1 Ind., dann Ende März bis Ende April an 3 Tagen je 1 Ind.; Anfang Oktober bis Ende Dezember an 11 Tagen bis zu 5 Ind. (14. Oktober)  
2005: im Januar an 8 Tagen bis zu 3 Ind., in den Monaten März, April und Juli bis November je eine Beobachtung von 1 Ind.

2006: im März, April, September, Oktober und Dezember je eine Beobachtung von 1 - 2 Ind.  
2007: Ende Februar und Mitte März je 1 Ind.; von Ende September bis Anfang November an 12 Tagen je 1 Ind.

#### **Steppenweihe** *Circus macrourus*

2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: am 19. September 1 adultes Männchen (K. & M. Robin; von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission akzeptiert)

#### **Wiesenweihe** *Circus pygargus*

2003: im Mai an 3 Tagen 1-2 Ind.  
2004: 1 Ind. am 31. August  
2005: 1 Ind. am 1. Mai  
2006: am 5. und 19. September je 1 Ind.  
2007: am 24. April, 3. Mai, 26. und 27. August je 1 Ind.

#### **Habicht** *Accipiter gentilis*

2003: Ende März bis Anfang Mai an 18 Tagen je 1 Ind., im Spätherbst 2 weitere Beobachtungen von 1 Ind.  
2004: von Anfang März bis Ende April regelmässig 1 Ind., am 30. März 2 Ind.; am 17. Juni eine Sommerbeobachtung; Mitte August bis Ende November wieder mehrmals 1 Ind.  
2005: von Anfang Januar bis Ende April an 11 Tagen je 1 Ind. und von Mitte Juli bis Ende November an 11 Tagen je 1 Ind., am 17. August 2 Ind.  
2006: von Ende März bis Ende November an 16 Tagen meistens 1 Ind., am 14. April 2 Ind.  
2007: von Ende Februar bis Anfang Oktober an 12 Tagen je 1 Ind.

#### **Sperber** *Accipiter nisus*

2003: erste Frühjahrsbeobachtung am 12. März, dann regelmässig bis Ende April; in den Monaten Juni bis August vereinzelt; Ende September bis Mitte Dezember wieder regelmässig  
2004: erste Frühjahrsbeobachtung am 7. März, dann regelmässig bis Ende April; in den Sommermonaten nur vereinzelt; ab Mitte August bis im Dezember wieder regelmässig  
2005: im Januar an 2 Tagen 1-2 Ind., dann ab Mitte März bis Mitte Mai meist 1, selten bis zu 4 Ind.; einzige Junibeobachtung: 1 Ind. am 7. Juni; ab Ende Juli bis Ende Jahr wieder regelmässig bis zu 5 Ind.  
2006: Mitte Februar bis Ende November an 38 Tagen bis zu 5 Ind.  
2007: Ende Januar bis Anfang Mai und Ende August bis Mitte Dezember an 33 Tagen 1 - 2 Ind.

#### **Mäusebussard** *Buteo buteo*

2003: ganzjährig anwesend  
2004: ganzjährig anwesend; maximal 31 Ind. am 28. September; mind. 1 Brut  
2005: ganzjährig anwesend; zur Zugzeit bis 100 Ind. am 25. März und 43 Ind. am 6. Oktober; mindestens 1 Brut  
2006: ganzjährig anwesend; am 26. März mindestens 50 Ind.  
2007: ganzjährig anwesend; im Februar und Oktober je ein Tag mit 17 Ind.

#### **Steinadler** *Aquila chrysaetos*

2003: 1 Ind. am 7. April  
2004: 1 Ind. am 9. März, 2 Ind. am 11. April  
2005: 2 Ind. am 24. April  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Fischadler** *Pandion heliaetus*

- 2003: am 3. und 7. April je 1 Ind.  
2004: je 1 Ind. am 11. und 23. Oktober  
2005: am 30. März, 14. Juli und 19. September je 1 Ind.  
2006: am 16. April und 19. September je 1 Ind.  
2007: am 10. Oktober 1 Ind.

**Rötelfalke** *Falco naumanni*

- 2003: keine Meldung  
2004: eine Beobachtung von 1 Ind. am 27. April wurde von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission abgelehnt  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Turmfalke** *Falco tinnunculus*

- 2003: ganzjährig anwesend  
2004: Meldungen von Anfang März bis Ende Jahr  
2005: ausser im Februar regelmässig Meldungen aus allen Monaten, 2 Bruten  
2006: ganzjährig anwesend  
2007: ganzjährig anwesend; bis zu 7 Ind.; mindestens 2 Bruten im Gebiet

**Rotfussfalke** *Falco vespertinus*

- 2003: im Mai an 7 Tagen bis zu 9 Ind.  
2004: im April an 3 Tagen je 1 Ind., am 2. Mai 6 Ind.; im Herbst 1 Ind. am 30. September  
2005: 2 Ind. am 14. und 1 Ind. am 16. Mai  
2006: keine Meldung  
2007: am 16. Mai und 2. Juni je 1 Ind.

**Merlin** *Falco columbarius*

- 2003: am 18. Januar und 12. März je 1 Ind.  
2004: keine Meldung  
2005: 3 Beobachtungen: am 24. und 29. März und am 29. September je 1 Ind.  
2006: am 19. September 1 Ind.  
2007: am 27. September, 16. Oktober und 7. November je 1 Ind.

**Baumfalke** *Falco subbuteo*

- 2003: von Mitte April bis Anfang Juni an 9 Tagen 1-2 Ind.; im Herbst nur 2 Meldungen von je 1 Ind.  
2004: von Mitte April bis Anfang Oktober regelmässig Beobachtungen; maximal 7 Ind. am 28. September  
2005: ein früher Rückkehrer am 31. März; ab Mitte April bis Ende Juni und Anfang August bis Anfang Oktober regelmässig 1-3 Ind.  
2006: von Mitte April bis Mitte Oktober regelmässig Beobachtungen von bis zu 5 Ind.  
2007: von Mitte April bis Anfang September regelmässig Beobachtungen von bis zu 4 Ind.

**Wanderfalke** *Falco peregrinus*

- 2003: von Anfang März bis Ende November aus allen Monaten Beobachtungen von Einzelvögeln  
2004: von Anfang März bis Anfang Dezember aus allen Monaten Beobachtungen von 1-2 Ind.  
2005: von Ende März bis Anfang November aus allen Monaten Beobachtungen von 1, selten 2 Ind.  
2006: von Ende März bis Ende November an 29 Tagen meistens 1 Ind., am 8. Mai 2 Ind.  
2007: im Februar an 2 Tagen, dann von Anfang April bis Anfang Oktober an 21 Tagen meistens 1 Ind., selten 2 Ind.

**Wachtel** *Coturnix coturnix*

- 2003: im Mai an 7 Tagen 1-2 Ind.  
2004: im Mai an 3 Tagen und Ende Juni je 1 Ind.  
2005: am 31. Mai und im Juni an 7 Tagen bis zu 3 Ind.  
2006: am 4. Juni 1 Ind.  
2007: am 9. und 20. Mai und 8. Juni je 1 Ind.

**Fasan** *Phasianus colchicus*

- 2003: Ende April 1 Männchen  
2004: keine Meldung  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Wasserralle** *Rallus aquaticus*

- 2003: ausser vom Februar und Oktober aus allen Monaten Beobachtungen von bis 4 Ind.  
2004: eine Beobachtung im Januar; dann von Mitte April bis Ende November regelmässig  
2005: regelmässig Beobachtungen von Ende März bis Ende Oktober und zwei Beobachtungen im Dezember  
2006: eine Beobachtung am 1. Januar; dann von Anfang April bis Ende November regelmässig; Jungvögel ab dem 19. Juli  
2007: zwei Beobachtungen im Januar; dann von Ende Februar bis Ende Jahr regelmässig; Jungvögel ab dem 19. Juli

**Tüpfelsumpfhuhn** *Porzana porzana*

- 2003: im April an 10 Tagen je 1 Ind.; Ende Mai, Ende August und Anfang September 3 weitere Beobachtungen von Einzelvögeln  
2004: einzige Frühjahrsbeobachtung: Ende März 1 Ind.; von Anfang August bis Mitte Oktober an 12 Tagen bis zu 10 Ind. gleichzeitig  
2005: im April 2 und am 7. Juni 1 Beobachtung von 1 Ind.; von Ende Juli bis Mitte Oktober an 16 Tagen bis zu 4 Ind.  
2006: in der 1. Maihälfte an 2 Tagen, dann vom 8. August bis 18. Oktober an 16 Tagen meist 1 - 2 Ind., am 22. August 4 Ind.  
2007: am 31. März, 9. und 31. Mai je 1 Ind.; dann vom 8. August bis 27. September an 12 Tagen 1 - 2 Ind.; letzte Beobachtung: am 10. Oktober 1 Ind.

**Kleines Sumpfhuhn** *Porzana parva*

- 2003: in der ersten Aprilhälfte an 3 Tagen je 1 Männchen  
2004: Anfang Mai bis Anfang Juni an 7 Tagen 1-2 Ind., teils rufend; im Spätsommer von Anfang August bis Anfang September an 4 Tagen je 1 Ind.  
2005: in der Zeit vom 5. April bis 10. Mai an 8 Tagen meist 1 Ind., am 10. Mai 2 Ind.  
2006: im August an 8 Tagen und am 5. September je 1 Ind.  
2007: am 11. April, in der 2. Augusthälfte an 4 Tagen und am 16. September je 1 Ind.; am 28. August 2 Ind.

**Zwergsumpfhuhn** *Porzana pusilla*

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: mehrere Meldungen im Mai; der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission wurde kein Protokoll eingereicht.  
2006: am 19. September 1 Ind. (K. & L. Felix; der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission akzeptiert)  
2007: keine Meldung

**Wachtelkönig** *Crex crex*

- 2003: einzige Beobachtung: 1 Rufer am 9. Juni  
2004: vom 20. Mai bis 27. Juni 1 Rufer; ein weiterer Rufer am 4. September  
2005: am 13. Mai 3 Rufer, am 14., 17. und 22. Mai je 1 Rufer  
2006: am 27. Mai, 7. Juli und 31. August je 1 Ind.  
2007: am 14. April und 6. Juni je 1 Ind.

**Teichhuhn** *Gallinula chloropus*

- 2003: ganzjährig anwesend; bis zu 8 Ind. gleichzeitig  
2004: fast ganzjährig anwesend; bis zu 12 Ind. gleichzeitig  
2005: ganzjährig anwesend; erste Jungvögel am 27. Juni  
2006: ganzjährig anwesend; Ende August bis zu 10 Ind.; erste Jungvögel am 19. Juli  
2007: ganzjährig anwesend; Anfang September bis zu 10 Ind.; erste Jungvögel am 19. Juli

**Blässhuhn** *Fulica atra*

- 2003: fast ganzjährig anwesend  
2004: Meldungen von Anfang März bis Ende Jahr; eine Revierkartierung ergibt 12 Paare  
2005: ganzjährig anwesend; bis zu 35 Ind.  
2006: ganzjährig anwesend; bis zu 38 Ind. Ende April; erste Jungvögel am 27. Mai  
2007: ganzjährig anwesend; bis zu 30 Ind.; erste Jungvögel am 14. Mai

**Kranich** *Grus grus*

- 2003: vom 27. März bis 25. April durchgehend 1 Ind. im Gebiet  
2004: am 18. März 15 Ind.; Ende März während 6 Tagen 1 Ind.  
2005: vom 20. bis 29. März 1 Ind., am 26. März 3 Ind.; am 11. Oktober kreisen 11 Ind.  
2006: am 24. Oktober 8 Ind.  
2007: am 26. / 27. März und 5. / 6. Juni je 1 Ind.

**Austernfischer** *Haematopus ostralegus*

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: 1 Ind. am 29. September  
2006: am 19. September 1 Ind.  
2007: keine Meldung

**Stelzenläufer** *Himantopus himantopus*

- 2003: keine Meldung  
2004: 1 Ind. am 31. März  
2005: 2 Ind. am 2. Mai  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Triel** *Burhinus oedipnemos*

- 2003: keine Meldung  
2004: 1 Ind. am 3. und 4. April  
2005: 1 Ind. am 24. April  
2006: am 26. März 1 Ind.  
2007: keine Meldung

**Flussregenpfeifer** *Charadrius dubius*

- 2003: Ende August an 3 Tagen, Mitte September und Mitte Oktober je an einem Tag 1-2 Ind.  
2004: keine Meldung  
2005: keine Meldung  
2006: am 9. April 3 Ind.; Ende August bis Anfang September an 5 Tagen 2 - 4 Ind.  
2007: am 4. April und 19. August je 1 Ind.

**Sandregenpfeifer** *Charadrius hiaticula*

- 2003: 1 Ind. am 27. August  
2004: keine Meldung  
2005: 2 Ind. am 6. Oktober  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Goldregenpfeifer** *Pluvialis apricaria*

- 2003: keine Meldung  
2004: in der ersten Märzhälfte an 4 Tagen; maximal 28 Ind. am 14. März  
2005: 3 Meldungen: am 23. März 2 Ind., am 20. Oktober 3 Ind. und am 7. November 5 Ind.  
2006: am 22. März 2 Ind.; am 27. März und 24. Oktober je 1 Ind.  
2007: am 15. März 2 Ind. und am 2. November 4 Ind.

**Kiebitzregenpfeifer** *Pluvialis squatarola*

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: vom 26. bis 29. September 1 Ind.  
2006: am 19. September 1 Ind.  
2007: keine Meldung

**Kiebitz** *Vanellus vanellus*

- 2003: von Anfang März bis Anfang Mai regelmässig anwesend; grösster Trupp: 152 Ind. am 2. März; mindestens 1 Brutversuch; Ende Juni bis Ende Oktober weniger häufig mit meistens weniger als 10 Ind.  
2004: In der ersten Märzhälfte riesige Ansammlungen mit bis zu 3000 Ind., bis Ende Mai dann regelmässig im Gebiet, jedoch ohne konkrete Bruthinweise; vom Juli bis November an 12 Tagen Trupps mit maximal 250 Ind.  
2005: ab Mitte März regelmässig bis zu 100 Ind., am 23. März sogar ca. 800 Ind.; von Anfang April bis Ende Juni regelmässig anwesend, mind. 1 Brut; von Anfang August bis Anfang Oktober an 8 Tagen bis zu 25 Ind.  
2006: von Mitte Februar bis Anfang Mai regelmässig anwesend; grösster Trupp: mindestens 400 Ind. am 22. März; Mitte Juli bis Ende Oktober an 10 Tagen bis zu 12 Ind.; keine Brut  
2007: von Ende Februar bis Ende April regelmässig anwesend; grösster Trupp: etwa 400 Ind. am 28. Februar; am 10. Juni und von Mitte Juli bis Mitte November an 13 Tagen bis zu 20 Ind.; keine Brut

**Knutt** *Calidris canutus*

- 2003: keine Meldung  
2004: 1 Ind. am 9. Mai  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: am 28. Oktober 1 Ind.

**Sanderling** *Calidris alba*

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: keine Meldung  
2006: am 19. September 1 Ind.  
2007: keine Meldung

**Zwergstrandläufer** *Calidris minuta*

- 2003: 1 Ind. am 31. August  
2004: 1 Ind. an 2 Tagen vom 31. August bis 1. September  
2005: 3 Ind. am 26. Juli  
2006: am 25. Mai 1 Ind.; am 19. September 5 Ind., am 21. September 2 Ind. und am 4. Oktober 2 Ind.  
2007: am 29. September und 10. Oktober je 3 Ind.

**Temminckstrandläufer** *Calidris temminckii*

- 2003: keine Meldung  
 2004: am 21. Juli und vom 29. August bis 1. September je 1 Ind.  
 2005: 1 Ind. am 14. April  
 2006: am 5. September 1 Ind.  
 2007: am 27. September 1 Ind.

**Sichelstrandläufer** *Calidris ferruginea*

- 2003: keine Meldung  
 2004: 1 Ind. am 4. September  
 2005: 2 Ind. am 24. August  
 2006: am 19. Juli, 22. August und 19. September 1 - 3 Ind.  
 2007: keine Meldung

**Alpenstrandläufer** *Calidris alpina*

- 2003: Ende August an 2 Tagen und Mitte Oktober an 1 Tag je 1 Ind.  
 2004: am 20. März 1 Ind.; im Herbst von Ende August bis Ende Oktober an 10 Tagen 1-6 Ind.  
 2005: zwischen Mitte August und Anfang Oktober an 5 Tagen 1-5 Ind.  
 2006: am 25. März 2 Ind. und zwischen Mitte September und Mitte Oktober an 6 Tagen; maximal 28 Ind. am 19. September  
 2007: keine Frühjahrsbeobachtung; im August an 5 Tagen bis zu 10 Ind., am 10. Oktober 4 Ind.

**Kampfläufer** *Philomachus pugnax*

- 2003: von Mitte März bis Ende Mai viele Beobachtungen mit bis zu 125 Ind. Ende März; im Herbst weniger häufig mit 4 Beobachtungen in der 2. Augsthälfte und 1 Beobachtung Ende Oktober von 7 Ind.  
 2004: von Anfang März bis Anfang Mai an 15 Tagen bis zu 23 Ind. und von Mitte August bis Ende September an 6 Tagen 1-4 Ind.  
 2005: von Ende März bis Ende April viele Beobachtungen mit bis zu 30 Ind. (10. April); im Herbst von Mitte August bis Anfang September an 7 Tagen 1-4 Ind.  
 2006: von Ende März bis Ende April regelmässig, bis zu 17 Ind.; in der 2. Septemberhälfte an 5 Tagen bis zu 34 Ind.  
 2007: von Anfang März bis Ende April regelmässig, bis zu 4 Ind.; im August an 4 Tagen 1 - 2 Ind.

**Zwergschnepfe** *Lymnocyptes minimus*

- 2003: am 10. Mai und am 2. Oktober je 1 Ind.  
 2004: 3 Beobachtungen: am 21. August., 21. Oktober und 30. Oktober je 1 Ind.  
 2005: 3 Beobachtungen: am 29. März, 10. April und 19. September je 1 Ind.  
 2006: 3 Beobachtungen: am 19. September, 4. Oktober und 23. November je 1 Ind.  
 2007: 3 Beobachtungen: am 22. Januar, 3. März und 10. Oktober je 1 Ind.

**Bekassine** *Gallinago gallinago*

- 2003: von Mitte Januar bis 10. Mai an 30 Tagen bis zu 30 Ind.; von Anfang August bis Mitte Dezember an 29 Tagen bis zu 12 Ind.  
 2004: von Anfang März bis Mitte Mai an 25 Tagen bis zu 20 Ind.; eine Junibeobachtung: 2 Ind. am 20. Juni; ab Ende Juli wieder regelmässig an 41 Tagen bis Ende November bis zu 20 Ind.  
 2005: am 22. Januar 1 Ind., dann ab Mitte März bis Ende April an 25 Tagen bis zu 40 Ind. (24. April); 1 Ind. am 22. Mai; ab Mitte Juli bis Ende November wieder regelmässig an 41

Tagen bis zu 45 Ind. (29. August)

- 2006: Mitte Februar 1 Ind.; dann von Mitte März bis Ende April und Mitte Juli bis Anfang Dezember regelmässig; maximal 50 Ind. am 26. März  
 2007: von Anfang Januar bis Anfang Mai und Mitte Juli bis Ende Dezember regelmässig; maximal 31 Ind. am 21. März

**Waldschnepfe** *Scolopax rusticola*

- 2003: 4 Ind. am 14. März (E. Widmer / Hasenzählung)  
 2004: am 25. August 2 Ind. und am 22. Dezember 1 Ind.  
 2005: 1 Ind. am 8. April  
 2006: keine Meldung  
 2007: am 31. März 1 Ind.

**Uferschnepfe** *Limosa limosa*

- 2003: 2 Ind. am 3. April  
 2004: 1 Ind. am 27. März  
 2005: am 30. März 4 Ind. und vom 19. bis 24. April 1-3 Ind.  
 2006: vom 16. - 20. April 1 Ind., am 21. April 3 Ind.  
 2007: keine Meldung

**Pfuhschnepfe** *Limosa lapponica*

- 2003: keine Meldung  
 2004: keine Meldung  
 2005: keine Meldung  
 2006: am 22. August 1 Ind.  
 2007: am 10. Oktober 1 Ind.

**Regenbrachvogel** *Numenius phaeopus*

- 2003: im April 4 Beobachtungen, Ende Juli und Anfang Oktober je 1 Beobachtung von je 1 Ind.  
 2004: im April 3 Beobachtungen und Mitte September 1 Beobachtung von 1-2 Ind.  
 2005: von Anfang April bis Anfang Mai an 10 Tagen 1-2 Ind.; von Ende Juli bis Ende August an 6 Tagen 1 Ind.  
 2006: Mitte April bis zu 14 Ind.; Mitte Juli und Mitte Oktober 2 weitere Beobachtungen mit 1 - 2 Ind.  
 2007: vom 6. bis 16. April durchgehend 1 Ind.; am 9. / 10. Mai nochmals 1 Ind.

**Grosser Brachvogel** *Numenius arquata*

- 2003: in der Zeit von Anfang März bis Ende April und Ende Mai bis Anfang Oktober viele Meldungen mit bis zu 168 Ind. Anfang September; bis zum Jahresende 2 weitere Meldungen von je 3 Ind.  
 2004: in der Zeit von Anfang März bis Anfang Mai und Ende Juni bis Ende November viele Meldungen mit bis zu 220 Ind. Ende August; in der Zeit dazwischen 2 Beobachtungen von je 1 Ind.  
 2005: am 8. Januar 30 Ind.; von Mitte März bis Ende April regelm. bis zu 120 Ind. (12. April); im Mai mehrmals 1-2 Ind.; von Ende Mai bis Ende September wieder regelmässig bis zu 250 Ind.; am 6. Oktober noch 3 Ind. und am 1. November 1 Ind.  
 2006: von Mitte März bis Anfang Dezember fast durchgehend Beobachtungen, keine Meldungen in der 1. Maihälfte; grösster Trupp: 154 Ind. am 19. Juli  
 2007: von Mitte Januar bis Ende Jahr durchgehend Beobachtungen; im April bis 50 Ind. und im Juli bis 200 Ind.

**Dunkler Wasserläufer** *Tringa erythropus*

- 2003: von Ende März bis Mitte April an 4 Tagen und Ende August an 2 Tagen je 1 Ind.  
 2004: 3 Beobachtungen: am 5. Mai 1 Ind., am 24. Juni 2 Ind. und am 4. September 1 Ind.

- 2005: von Mitte April bis Anfang Mai an 6 Tagen 1 Ind. und von Mitte August bis Mitte September an 8 Tagen bis zu 7 Ind.  
 2006: von Ende März bis Mitte Mai an 3 Tagen und Ende August bis Ende September an 4 Tagen je 1 Ind.  
 2007: von Ende März bis Mitte April an 5 Tagen bis zu 3 Ind.

**Rotschenkel** *Tringa totanus*

- 2003: vom 29.-31. August 1-2 Ind.  
 2004: am 9. Mai 31 Ind. und am 15. Mai 2 Ind.  
 2005: vom 20. März bis 7. Mai an 6 Tagen 1-3 Ind.; am 26. Juli 1 Ind. und im September an 2 Tagen 1-3 Ind.  
 2006: am 26. März 1 Ind.; vom 13. bis 19. April durchgehend bis zu 30 Ind.; eine Sommerbeobachtung: am 19. Juli 2 Ind.  
 2007: vom 31. März bis 9. April durchgehend 1 - 2 Ind.

**Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis*

- 2003: keine Meldung  
 2004: keine Meldung  
 2005: 2 Ind. am 7. Mai (K. Robin)  
 2006: keine Meldung  
 2007: vom 4. - 9. April durchgehend 1 Ind.

**Grünschenkel** *Tringa nebularia*

- 2003: von Mitte April bis Anfang Mai an 4 Tagen und Ende August während 4 Tagen 1-2 Ind.  
 2004: von Ende März bis Mitte Mai an 13 Tagen bis zu 6 Ind.; von Ende August bis Ende September an 5 Tagen 1-5 Ind.  
 2005: im April an 10 Tagen bis zu 27 Ind. (18. April) und am 22. Mai 3 Ind., dann wieder von Mitte August bis Anfang September an 10 Tagen 1-6 Ind.  
 2006: von Ende März bis Anfang Mai an 11 Tagen bis zu 4 Ind.; dann Mitte August bis Anfang Oktober an 7 Tagen 1 - 3 Ind.  
 2007: von Anfang April bis Anfang Mai an 6 Tagen bis zu 14 Ind.; Mitte Juli, Mitte August und Anfang September je 1 Tag mit 1 - 3 Ind.

**Waldwasserläufer** *Tringa ochropus*

- 2003: von Mitte März bis Mitte April an 12 Tagen und von Mitte Juni bis Anfang September an 10 Tagen bis zu 11 Ind.  
 2004: von Mitte März bis Ende April an 14 Tagen und von Mitte Juni bis Ende September an 31 Tagen bis zu 10 Ind.  
 2005: von Ende März bis Anfang Mai an 17 Tagen bis zu 12 Ind. (18. April); zwei Junibeobachtungen; von Anfang Juli bis Mitte September an 24 Tagen bis zu 12 Ind. (26. Juli); letzte Beobachtung: 1 Ind. am 7. November  
 2006: von Ende März bis Ende April an 25 Tagen und von Anfang Juni bis Mitte Oktober an 28 Tagen bis zu 12 Ind. (9. April)  
 2007: von Ende Januar bis Mitte April an 19 Tagen und von Anfang Juni bis Ende September an 30 Tagen bis zu 11 Ind. (4. August)

**Bruchwasserläufer** *Tringa glareola*

- 2003: von Mitte April regelmässig bis Anfang Mai bis zu 9 Ind.; im Juni und Juli an 4 Tagen 1-2 Ind.; ab Ende August bis Anfang September wieder regelmässig 1-2 Ind.  
 2004: von Mitte April regelmässig bis Anfang Mai bis zu 10 Ind.; von Ende Juni bis Mitte August an 6 Tagen 1-2 Ind.; ab Ende August bis Mitte September wieder regelmässig bis zu 10 Ind.  
 2005: erste Beobachtung: 1 Ind. am 26. März, dann bis Ende Mai an 25 Tagen bis zu 35 Ind. (8. Mai); von Anfang Juli bis Mitte September bis zu 48 Ind. (24. August)  
 2006: erste Frühjahrsbeobachtung: 1 Ind. am 25. März; dann von Mitte April bis Anfang Mai bis zu 20 Ind.; von Mitte Juli bis

Ende September bis zu 16 Ind.

- 2007: von Mitte April bis Mitte Mai und Mitte Juli bis Anfang September; maximal 119 Ind. am 6. Mai

**Flussuferläufer** *Actitis hypoleucos*

- 2003: keine Meldung  
 2004: am 28. April 1 Ind. und am 29. August 6 Ind.  
 2005: am 19. April 2 Ind. und am 2. August 3 Ind.  
 2006: am 21. Mai und im August an 3 Tagen je 1 Ind.  
 2007: am 19. Juli, 4. und 16. August je 1 Ind.

**Steinwälzer** *Arenaria interpres*

- 2003: keine Meldung  
 2004: keine Meldung  
 2005: keine Meldung  
 2006: am 19. September 2 Ind. (K. & L. Felix)  
 2007: keine Meldung

**Schwarzkopfmöwe** *Larus melanocephalus*

- 2003: von Mitte April bis Anfang Mai 3 Beobachtungen von 1-3 Ind.  
 2004: von Ende März bis Anfang Juni an 12 Tagen 1-3 Ind.  
 2005: von Mitte März bis Ende August an 14 Tagen 1-5 Ind.  
 2006: von Anfang April bis Ende Mai an 8 Tagen bis zu 4 Ind.  
 2007: im April an 4 Tagen und im August an 4 Tagen bis zu 4 Ind.

**Zwergmöwe** *Larus minutus*

- 2003: keine Meldung  
 2004: keine Meldung  
 2005: keine Meldung  
 2006: am 4. Oktober 1 adultes Ind. (K. Robin)  
 2007: keine Meldung

**Lachmöwe** *Larus ridibundus*

- 2003: von Anfang März bis Ende Oktober; bis zu 250 Ind. am 9. März; 2 Schätzungen ergeben Anfang Mai etwa 30 bis 40 besetzte Nester  
 2004: von Mitte März bis Anfang Oktober; bis zu 1000 Ind. am 19. März; eine Nesterzählung ergibt 75 Nester  
 2005: von Mitte März bis Anfang Oktober; grosse Trupps in der zweiten Märzhälfte, maximal 6000 Ind. am 20. März; die Zahl der Nester wurde auf ca. 30 geschätzt; 15 Flügglinge flogen aus.  
 2006: von Mitte März bis Ende November; Ende März Ansammlungen von bis zu 5000 Ind.; im Mai wurden etwa 20 Nester geschätzt; erste Jungvögel am 3. Juni  
 2007: von Anfang März bis Ende November; Anfang März bis zu 2000 Ind.; erstmals keine Brut!

**Sturmmöwe** *Larus canus*

- 2003: im Frühling an 3 Tagen beobachtet  
 2004: Beobachtungen in den Monaten Januar, März, Mai und Juni; maximal 200 Ind. am 18. Januar  
 2005: zwischen Mitte März und Anfang April bis zu 300 Ind. (19. und 20. März); dann am 21. April 5 Ind.  
 2006: von Ende Februar bis Ende April ziemlich regelmässig anwesend; maximal 500 Ind. am 26. März; eine Herbstbeobachtung: 37 Ind. am 24. Oktober  
 2007: von Ende Februar bis Anfang April an 8 Tagen bis zu 40 Ind.; eine Herbstbeobachtung: 1 Ind. am 20. Oktober

**Heringsmöwe** *Larus fuscus*

- 2003: keine Meldung  
 2004: keine Meldung

2005: 3 Beobachtungen: am 19. März 1 Ind., am 15. August 4 Ind. und am 19. September wieder 1 Ind.  
2006: am 19. und 21. September je 1 Ind.  
2007: am 29. August 2 adulte Ind.

**Mittelmeermöwe** *Larus michahellis*

2003: im April und Mai je 1 Beobachtung von 1-2 Ind.  
2004: vom April bis Juni 7 Beobachtungen von 1-3 Ind.  
2005: von Ende März bis Anfang November an 25 Tagen aus allen Monaten Beobachtungen von bis zu 35 Ind. (6. August)  
2006: von Mitte März bis Ende Jahr regelmässig Beobachtungen; maximal 32 Ind. am 30. August  
2007: Beobachtungen aus allen Monaten; maximal 21 Ind. am 4. August

**Flusseeschwalbe** *Sterna hirundo*

2003: 1 Ind. am 27. April  
2004: keine Meldung  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Trauerseeschwalbe** *Chlidonias niger*

2003: keine Meldung  
2004: 2 Ind. am 9. Juni  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Strassentaube** *Columba livia forma domestica*

2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: 1 Ind. am 28. Mai  
2006: keine Meldung  
2007: am 21. April 1 Ind.

**Hohltaube** *Columba oenas*

2003: zwischen Ende Februar und Ende März mehrmals 1 Ind.; Ende September 2 Beobachtungen mit maximal 9 Ind. am 23. September  
2004: von Anfang März bis Mitte April 7 Beobachtungen mit 1-3 Ind.; von Mitte August bis Ende Oktober 5 Beobachtungen mit maximal 11 Ind. am 11. Oktober  
2005: von Mitte März bis Mitte April an 7 Tagen 1-5 Ind.; am 14. Juli 2 Ind.; dann von Anfang September bis Anfang Oktober an 3 Tagen 1-5 Ind.  
2006: von Ende März bis Anfang Juni an 6 Tagen und Mitte September bis Anfang Oktober an 4 Tagen bis zu 5 Ind.  
2007: Ende Februar, Anfang März, Mitte Juli, Ende September und Anfang November jeweils 1 - 4 Ind.

**Ringeltaube** *Columba palumbus*

2003: Meldungen von Ende März bis Anfang September  
2004: Meldungen von Anfang März bis Ende November; bis zu 30 Ind. Mitte März  
2005: Meldungen von Mitte März bis Anfang November; auf dem Zug bis zu 800 Ind. am 6. Oktober  
2006: Meldungen von Ende März bis Ende November; am 4. Oktober etwa 80 Ind.  
2007: Meldungen von Ende Januar bis Anfang November; keine Trupps über 20 Ind.

**Türkentaube** *Streptopelia decaocto*

2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: im März an 3 Tagen und im Mai an 2 Tagen 1-2 Ind.  
2006: keine Meldung  
2007: im April, Juli und Oktober an je einem Tag 1 - 2 Ind.

**Turteltaube** *Streptopelia turtur*

2003: Ende März bis Ende Mai an 4 Tagen 1-4 Ind.; im Herbst 2 Beobachtungen von 1 Ind.  
2004: Mitte Mai bis Anfang Juni an 4 Tagen 2-3 Ind.; einzige Herbstbeobachtung: 1 Ind. am 14. September  
2005: zwischen Ende April und Mitte Mai an 3 Tagen 2-3 Ind. und zwischen Ende Juli und Mitte September an 4 Tagen 1-3 Ind.  
2006: zwischen Ende April und Ende Mai an 3 Tagen und Anfang August bis Anfang Oktober an 3 Tagen je 1 - 2 Ind.  
2007: zwischen Ende April und Mitte Mai an 4 Tagen 1 - 3 Ind.; einzige Herbstmeldung: am 27. September 2 Ind.

**Kuckuck** *Cuculus canorus*

2003: eine frühe Beobachtung am 19. März; ab Mitte April bis Mitte Juni regelmässig bis zu 3 Ind. anwesend; einzige Herbstbeobachtung: 1 Ind. am 29. August  
2004: vom 17. April bis Ende Juni regelmässig bis zu 3 Rufer; einzige Herbstbeobachtung: 1 Ind. am 19. August  
2005: vom 23. April bis Mitte Juni regelmässig 1-2 Ind.; im Juli, August und September je eine Beobachtung von 1 Ind.  
2006: vom 17. April bis Anfang Juni regelmässig 1 - 2 Ind.; danach keine Meldungen mehr  
2007: vom 21. April bis Mitte Juni regelmässig 1 - 2 Ind.; Ende Juli bis Mitte September an 5 Tagen je 1 Ind.

**Schleiereule** *Tyto alba*

2003: keine Meldung  
2004: 1 Ind. am 13. September  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Uhu** *Bubo bubo*

2003: keine Meldung  
2004: am 7. März und 23. Juni je 1 Ind.  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Waldkauz** *Strix aluco*

2003: 1 Rufer am 9. Juni  
2004: zwischen Anfang Februar und Ende August an 8 Tagen beobachtet  
2005: 1 Ind. am 26. Mai  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Waldohreule** *Asio otus*

2003: Beobachtungen von Mitte März bis Ende Jahr; ab Ende Juni bettelnde Jungvögel; maximal 21 Ind. am 29. Dezember zusammen in einer Gebüschgruppe  
2004: fast ganzjährig anwesend; bettelnde Jungvögel ab Anfang Juni, mindestens 2 Brutpaare; maximal 18 Ind. am 24. November zusammen in einer Gebüschgruppe  
2005: fast ganzjährig anwesend, in den Wintermonaten bis zu 22 Ind. zusammen; mindestens 7 Brutpaare im Gebiet

- 2006: von Ende März bis Ende Mai an 14 Tagen 1 - 2 Ind.; mindestens 1 Brut  
 2007: Ende August eine Familie mit 3 Jungen; im November 2 Beobachtungen von je 1 Ind.

**Sumpfohreule** *Asio flammeus*

- 2003: keine Meldung  
 2004: keine Meldung  
 2005: keine Meldung  
 2006: am 4. Oktober 1 Ind.  
 2007: am 27. September 1 Ind.

**Ziegenmelker** *Caprimulgus europaeus*

- 2003: keine Meldung  
 2004: 1 Ind. am 23. Mai (Mario Zanolli)  
 2005: keine Meldung  
 2006: keine Meldung  
 2007: keine Meldung

**Mauersegler** *Apus apus*

- 2003: 10 Meldungen zwischen dem 20. April und 9. Juli  
 2004: 32 Meldungen zwischen dem 18. April und 22. August  
 2005: 45 Meldungen zwischen dem 24. April und 24. August; am 24. August ca. 350 Ind.  
 2006: vom 17. April bis 19. September an 39 Tagen beobachtet  
 2007: vom 29. April bis 11. August an 27 Tagen beobachtet

**Alpensegler** *Apus melba*

- 2003: keine Meldung  
 2004: keine Meldung  
 2005: 3 Beobachtungen: am 29. März 3 Ind., am 31. März 2 Ind. und am 14. April 2 Ind.  
 2006: am 10. Juni und 22. August je 2 Ind.  
 2007: am 27. Juni 1 Ind.

**Eisvogel** *Alcedo atthis*

- 2003: Mitte Januar und Anfang März je 1 Beobachtung; im Herbst von Ende August bis Ende November an 9 Tagen jeweils 1 Ind.  
 2004: zwischen Anfang Juli und Ende Jahr an 22 Tagen bis zu 3 Ind. im Gebiet  
 2005: im Januar an 4 Tagen 1 Ind. und Mitte März 1 Ind., dann zwischen Mitte Juni und Ende Oktober an 22 Tagen meist 1, selten 2 Ind.  
 2006: fast ganzjährig anwesend; keine Meldungen in den Monaten Februar und März  
 2007: fast ganzjährig anwesend; keine Meldungen in den Monaten Juni, November und Dezember

**Bienenfresser** *Merops apiaster*

- 2003: 3 Ind. am 25. Mai  
 2004: keine Meldung  
 2005: 7 Ind. am 17. Mai  
 2006: am 19. Juli 5 Ind. (K. Felix)  
 2007: keine Meldung

**Wiedehopf** *Upupa epops*

- 2003: einzige Beobachtung: 1 Ind. am 19. April  
 2004: zwischen Ende März und Anfang Mai an 8 Tagen je 1 Ind.; dann 1 Ind. am 21. Juli  
 2005: im April an 3 Tagen und Ende August eine Beobachtung von je 1 Ind.  
 2006: zwischen Ende März und Mitte April an 6 Tagen 1 - 2 Ind.; eine Herbstbeobachtung: 1 Ind. am 8. August  
 2007: im April an 6 Tagen je 1 Ind.

**Wendehals** *Jynx torquilla*

- 2003: am 31. August und 10. September je 1 Beobachtung von 1 Ind.  
 2004: einzige Beobachtung: 1 Ind. am 12. April  
 2005: am 13. und 27. April und am 25. August je 1 Ind.  
 2006: in der 2. Aprilhälfte an 2 Tagen und im August an 2 Tagen je 1 Ind.  
 2007: keine Meldung

**Grauspecht** *Picus canus*

- 2003: keine Meldung  
 2004: keine Meldung  
 2005: keine Meldung  
 2006: am 3. April 1 Ind. (A. Schneeberger)  
 2007: keine Meldung

**Grünspecht** *Picus viridis*

- 2003: von Anfang Jahr bis Ende November an 13 Tagen jeweils 1 Ind.  
 2004: von Mitte März bis Ende Jahr an 23 Tagen jeweils 1-2 Ind.  
 2005: von Anfang März bis Mitte April an 5 Tagen; eine Beobachtung am 7. Juni; dann von Mitte Juli bis Ende November an 17 Tagen jeweils 1 Ind.  
 2006: im April an 3 Tagen und von Anfang Juni bis Ende November an 14 Tagen 1 - 2 Ind.  
 2007: fast ganzjährig anwesend; Beobachtungen aus den Monaten April und Juni fehlen

**Schwarzspecht** *Dryocopus martius*

- 2003: keine Meldung  
 2004: Ende Juni an 3 Tagen und im Herbst an 2 Tagen jeweils 1 Ind.  
 2005: keine Meldung  
 2006: Ende Juni bis Mitte Juli an 4 Tagen je 1 Ind.  
 2007: von Ende April bis Mitte Oktober an 7 Tagen 1 - 2 Ind.

**Buntspecht** *Dendrocopos major*

- 2003: einige Meldungen von Anfang März bis Ende November  
 2004: Beobachtungen von Mitte April bis Ende Jahr  
 2005: ganzjährig anwesend; bis zu 3 Ind.  
 2006: fast ganzjährig anwesend  
 2007: ganzjährig anwesend

**Kleinspecht** *Dendrocopos minor*

- 2003: einzige Beobachtung: 1 Ind. am 23. März  
 2004: in den Monaten Februar, März, Juni, Juli und September je 1-2 Beobachtungen von 1 Ind.  
 2005: zwischen Ende März und Ende September an 8 Tagen 1-2 Ind.  
 2006: im April, Juni, Juli, September und Oktober an je einem Tag 1 Ind.  
 2007: 12 Meldungen von 1 - 2 Ind.; keine Beobachtungen in den Monaten Juni, September und November

**Heidelerche** *Lullula arborea*

- 2003: 2 Beobachtungen: am 12. April 1 Ind. und am 24. Oktober 8 Ind.  
 2004: Mitte März an 2 Tagen, Mitte Oktober bis Anfang November an 4 Tagen; maximal 26 Ind. am 22. Oktober  
 2005: am 20. März 2 Ind. und am 7. April 3 Ind.; zwischen Ende September und Mitte Oktober an 3 Tagen bis zu 17 Ind.  
 2006: am 20. März 1 Ind. und am 4. April 3 Ind.; auf dem Herbstzug am 5. September 21 Ind. und Mitte Oktober 8 Ind.  
 2007: am 15. März 6 Ind.; auf dem Herbstzug von Ende September bis Mitte Oktober an 6 Tagen bis zu 15 Ind.

**Feldlerche** *Alauda arvensis*

- 2003: Anfang März und Mitte April je eine Beobachtung von 1-2 Ind.; im Oktober 5 Beobachtungen mit bis zu 100 Ind.  
2004: im Frühling zwischen Anfang März und Ende April bis zu 150 Ind.; im Herbst zwischen Anfang Oktober und Ende November bis zu 60 Ind.  
2005: in der 2. Märzhälfte an 4 Tagen und Ende September bis Anfang November an 6 Tagen bis zu 100 Ind. (20. Oktober)  
2006: von Ende Februar bis Mitte April und Ende September bis Ende November je bis zu 300 Ind.  
2007: von Ende Januar bis Ende März und Ende September bis Anfang Dezember bis zu 300 Ind.

**Uferschwalbe** *Riparia riparia*

- 2003: einzige Frühjahrsbeobachtung: 20 Ind. am 27. April; Mitte September an 2 Tagen je 1 Ind.  
2004: Ende April und Mitte Mai je eine Beobachtung von bis zu 10 Ind.; häufiger im Herbst: zwischen Mitte August und Ende September bis zu 300 Ind.  
2005: Mitte April und Mitte Mai je 1 Beobachtung von 6 Ind.; dann ab Mitte Juli bis Mitte September an 8 Tagen bis zu 50 Ind. (20. Juli)  
2006: von Ende März bis Ende Mai an 8 Tagen und in der 2. Septemberhälfte an 2 Tagen je 1 - 3 Ind.  
2007: von Anfang April bis Anfang Mai an 5 Tagen und Anfang August bis Anfang Oktober an 4 Tagen bis zu 30 Ind.

**Felsenschwalbe** *Ptyonoprogne rupestris*

- 2003: keine Meldung  
2004: im Frühling zwischen Mitte März und Mitte April bis zu 50 Ind.  
2005: in der 2. Märzhälfte an 6 Tagen bis zu 70 Ind. (31. März); 30 Ind. am 18. April; eine Herbstmeldung: 40 Ind. am 6. Oktober  
2006: von Mitte März bis Mitte April an 8 Tagen bis zu 30 Ind.  
2007: vom 21. Februar bis Ende März an 9 Tagen bis zu 100 Ind.; Ende September und Anfang Oktober zwei weitere Beobachtungen von 2 - 3 Ind.

**Rauchschwalbe** *Hirunda rustica*

- 2003: Meldungen vom 30. März bis 25. Oktober; bis zu 600 Ind. Mitte September  
2004: Meldungen vom 28. März bis 21. Oktober; bis zu 300 Ind. Mitte August  
2005: Meldungen vom 25. März bis 6. Oktober; bis zu 300 Ind. Anfang September  
2006: Meldungen vom 22. März bis zum 18. Oktober; bis zu 500 Ind. Mitte September  
2007: Meldungen vom 15. März bis zum 10. Oktober; bis zu 2000 Ind. Ende Juli

**Mehlschwalbe** *Delichon urbicum*

- 2003: wenige Meldungen zwischen Mitte April und Mitte Oktober  
2004: Meldungen zwischen Ende April und Ende September; bis zu 300 Ind. Mitte August  
2005: Meldungen zwischen 30. März und Anfang Oktober; bis zu 300 Ind. Mitte August  
2006: Meldungen vom 4. April bis 27. September; bis zu 500 Ind. Mitte September  
2007: Meldungen vom 12. April bis 27. September

**Brachpieper** *Anthus campestris*

- 2003: 1 Ind. am 30. April  
2004: 1 Ind. am 9. September

- 2005: keine Meldung  
2006: am 6. Mai und 5. September je 1 Ind.  
2007: keine Meldung

**Baumpieper** *Anthus trivialis*

- 2003: im April an 2 Tagen 1-2 Ind.; eine Brutzeitbeobachtung: 1 Sänger am 5. Juni  
2004: im April und im September je 1 Beobachtung von 1-2 Ind.  
2005: Ende April an 3 Tagen, dann Mitte August und Anfang Oktober je an 1 Tag bis zu 10 Ind.  
2006: von Ende März bis Ende April an 9 Tagen bis zu 20 Ind.  
2007: Mitte April 1 Ind. und Anfang September 4 Ind.

**Wiesenpieper** *Anthus pratensis*

- 2003: in den Monaten Januar bis März und Oktober bis Dezember bis zu 20 Ind.  
2004: von Anfang Jahr bis Anfang April und Oktober bis Dezember bis zu 16 Ind.  
2005: von Mitte Januar bis Ende April und Mitte September bis Ende Jahr an 20 Tagen bis zu 32 Ind. (20. März)  
2006: von Anfang Januar bis Mitte April an 18 Tagen bis zu 100 Ind. und von Mitte September bis Ende November an 8 Tagen bis zu 20 Ind.  
2007: von Ende Januar bis Mitte April an 22 Tagen und Ende September bis Anfang Dezember an 16 Tagen bis zu 25 Ind.

**Rotkehlpieper** *Anthus cervinus*

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: 1 Ind. am 20. Oktober (K. Felix)  
2006: am 4. Oktober 1 Ind. (K. & L. Felix)  
2007: keine Meldung

**Bergpieper** *Anthus spinoletta*

- 2003: in den Monaten Januar bis April und Oktober bis Dezember bis zu 50 Ind. (11. April)  
2004: von Januar bis Mitte Mai und ab Ende September bis Ende Jahr bis zu 80 Ind. (22. Dezember)  
2005: von Anfang Jahr bis Ende April und Ende September bis Ende Jahr bis zu 70 Ind. (16. Januar)  
2006: von Anfang Jahr bis Mitte April und von Anfang Oktober bis Ende Jahr; bis zu 600 Ind. am 11. April  
2007: von Anfang Jahr bis Mitte April und Ende September bis Ende Jahr; bis zu 50 Ind. im Februar und April

**Schafstelze** *Motacilla flava*

- 2003: zwischen Ende April und Mitte Mai an 3 Tagen und im September an 2 Tagen bis zu 4 Ind.  
2004: im April an 5 Tagen und Ende August bis Ende September an 8 Tagen bis zu 80 Ind.  
2005: zwischen Ende März und Anfang Mai an 6 Tagen und Ende August bis Anfang Oktober an 5 Tagen 1-4 Ind.  
2006: von Ende März bis Ende April an 14 Tagen und Anfang August bis Mitte Oktober an 8 Tagen; maximal 100 Ind. am 11. April  
2007: im April an 2 Tagen und Ende August bis Mitte Oktober an 5 Tagen bis zu 10 Ind.

**Bergstelze** *Motacilla cinerea*

- 2003: von Januar bis März und Ende September bis Dezember mehrere Beobachtungen  
2004: fast ganzjährig; fehlt in den Monaten Februar und Mai bis Juli  
2005: von Anfang Februar bis Anfang Mai und Mitte August bis

- Ende Jahr an 22 Tagen 1-2 Ind.  
 2006: von Anfang Jahr bis Anfang April und Mitte August bis Ende Jahr an 18 Tagen bis zu 5 Ind.  
 2007: von Anfang Jahr bis Mitte März und Anfang August bis Anfang Dezember an 31 Tagen bis zu 3 Ind.

- und 16. Mai je 1 Ind.; eine Beobachtung aus der Brutzeit: 1 Sanger am 7. Juni; eine Herbstbeobachtung: 1 Ind. am 19. September  
 2006: am 16. und 25. April je 1 Ind.  
 2007: am 24. April und 31. Mai je 1 Ind.

**Bachstelze** *Motacilla alba*

- 2003: ganzjahrig anwesend  
 2004: ganzjahrig anwesend; eine Brut auf der Plattform des gr. Turms  
 2005: ganzjahrig anwesend; maximal etwa 40 Ind. am 29. September  
 2006: ganzjahrig anwesend; bis zu 200 Ind. am 11. April  
 2007: ganzjahrig anwesend; bis zu 50 Ind. Anfang Dezember

**Seidenschwanz** *Bombycilla garrulus*

- 2003: keine Meldung  
 2004: am 22. Dezember 50 Ind. und am 27. Dezember 20 Ind.  
 2005: zwischen dem 1. und 22. Januar an 6 Tagen bis zu 50 Ind. (9. Januar)  
 2006: am 12. Februar 21 Ind.  
 2007: keine Meldung

**Wasseramsel** *Cinclus cinclus*

- 2003: von Anfang Jahr bis Anfang Marz und im Dezember einige Beobachtungen an der Linth und am Steinenbach  
 2004: im Januar, Februar und Dezember einige Beobachtungen  
 2005: von Januar bis Mitte Marz und im Dezember einige Beobachtungen an der Linth und am Steinenbach  
 2006: von Januar bis Marz mehrere Beobachtungen am Linthkanal  
 2007: im Januar, April und Dezember vereinzelt

**Zaunkonig** *Troglodytes troglodytes*

- 2003: Beobachtungen von Januar bis April und von Ende August bis Ende Jahr  
 2004: fast ganzjahrig anwesend; es fehlen Beobachtungen aus den Monaten Februar und Mai  
 2005: Beobachtungen von Anfang Jahr bis Mitte Juni und von Mitte September bis Ende Jahr  
 2006: Beobachtungen von Januar bis Juni und Ende September bis Ende Jahr  
 2007: Beobachtungen von Januar bis Anfang Juni und Ende August bis Ende Jahr

**Heckenbraunelle** *Prunella modularis*

- 2003: im Marz, Oktober und November je eine Beobachtung  
 2004: im Oktober 2, im November 1 Beobachtung  
 2005: im April, Mai und Oktober je eine Beobachtung von 1 Ind.  
 2006: von Ende Marz bis Mitte April an 6 Tagen je 1 Ind.  
 2007: Ende Marz und Anfang Oktober je an 2 Tagen 1 - 2 Ind.

**Rotkehlchen** *Erithacus rubecula*

- 2003: Beobachtungen von Anfang Jahr bis Anfang Mai und vom September bis Ende Jahr  
 2004: ganzjahrig anwesend  
 2005: ganzjahrig anwesend  
 2006: fast ganzjahrig anwesend  
 2007: ganzjahrig anwesend

**Nachtigall** *Luscinia megarhynchos*

- 2003: 1 Ind. am 27. April  
 2004: von Mitte April bis Anfang Mai an 5 Tagen und im August an 5 Tagen jeweils 1 Ind.  
 2005: vom Fruhlingszug 3 Beobachtungen: am 8. April, 28. April

**Blauehlchen** *Luscinia svecica*

- 2003: erste Fruhjahrsbeobachtung am 23. Marz; bis Mitte April an 18 Tagen bis zu 9 Ind.; zwischen dem 19. August und 10. Oktober an 18 Tagen bis zu 10 Ind.  
 2004: erste Fruhjahrsbeobachtung am 18. Marz; bis zum 19. April an 5 Tagen 1-2 Ind.; auf dem Herbstzug vom 27. August bis 26. September an 10 Tagen bis zu 8 Ind.  
 2005: erste Fruhjahrsbeobachtung am 14. Marz; bis zum 24. April an 11 Tagen 1-6 Ind.; dann vom 19. August bis 29. September an 12 Tagen 1-2 Ind.  
 2006: erste Fruhjahrsbeobachtung am 25. Marz; bis Mitte April an 13 Tagen bis zu 4 Ind.; dann vom 15. August bis 4. Oktober an 21 Tagen bis zu 4 Ind.  
 2007: erste Fruhjahrsbeobachtung am 28. Marz; bis Anfang April an 5 Tagen je 1 Ind., dann vom 18. August bis 27. September an 17 Tagen bis zu 6 Ind.

**Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros*

- 2003: mehrere Meldungen von Ende Marz bis Mitte April; maximal 12 Ind. am 14. April  
 2004: Meldungen von Ende Marz bis Anfang November  
 2005: Meldungen von Mitte Marz bis Mitte Oktober; vom Monat August fehlen Beobachtungen  
 2006: fast ganzjahrig anwesend; keine Meldungen aus den Monaten September und Dezember  
 2007: fast ganzjahrig anwesend; keine Meldungen aus den Monaten Juni und November

**Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus*

- 2003: Mitte April an 1 Tag und im September an 4 Tagen je 1 Ind.  
 2004: von Ende Marz bis Ende April an 7 Tagen und von Mitte August bis Mitte Oktober an 10 Tagen bis zu 5 Ind.  
 2005: von Mitte April bis Anfang Mai und Anfang September bis Mitte Oktober an 11 Tagen bis zu 6 Ind.; eine Sommerbeobachtung: 1 Ind. am 26. Juli  
 2006: Ende Marz bis Ende April und Anfang August bis Ende Oktober an 21 Tagen bis zu 5 Ind.  
 2007: Anfang April bis Mitte Mai und Ende August bis Ende September an 11 Tagen bis zu 4 Ind.

**Braunkehlchen** *Saxicola rubetra*

- 2003: erste Fruhjahrsbeobachtung am 14. April, letzte Beobachtung am 22. Oktober; zu den Zugzeiten maximal 20 Ind. Ende September; mehrere Brutpaare  
 2004: erste Fruhjahrsbeobachtung am 3. April, letzte Beobachtung am 24. Oktober; zu den Zugzeiten maximal 40 Ind. Ende April; eine Revierkartierung ergibt 10 Paare  
 2005: erste Fruhjahrsbeobachtung: 1 Ind. am 8. April, letzte Beobachtung am 6. Oktober; maximal ca. 40 Ind. am 27. April; eine Revierkartierung ergibt 10 bis 11 Territorien.  
 2006: erste Fruhjahrsbeobachtung am 9. April; letzte Beobachtung am 24. Oktober; Ende August bis zu 30 Ind.; eine Kartierung ergibt 10 Brutpaare  
 2007: erste Fruhjahrsbeobachtung am 6. April, letzte Beobachtung am 10. Oktober; am 27. April 47 Ind.; eine Kartierung ergibt 8 Brutpaare

**Schwarzkehlchen** *Saxicola torquatus*

- 2003: im Frühling von Anfang März bis Mitte April; im Herbst ab Mitte September bis Mitte Dezember bis zu 10 Ind.
- 2004: von Mitte März bis Anfang November regelmässig Beobachtungen; während des Zuges bis zu 10 Ind.; eine Revierkartierung ergibt 3 Paare
- 2005: von Mitte März bis Ende Oktober bis zu 5 Ind.; eine Revierkartierung ergibt mindestens 3 Bruten.
- 2006: von Mitte März bis Ende Oktober; bis zu 10 Ind. Mitte April; mindestens 2 Bruten
- 2007: von Ende Februar bis Anfang Dezember; bis zu 8 Ind. Mitte Oktober

**Steinschmätzer** *Oenanthe oenanthe*

- 2003: von Ende März bis Anfang Mai und Ende August und Mitte Oktober an 10 Tagen bis zu 4 Ind.
- 2004: von Ende März bis Anfang Mai und Mitte August bis Mitte Oktober an 20 Tagen bis zu 10 Ind.
- 2005: von Ende März bis Anfang Mai und Anfang August bis Anfang Oktober an 24 Tagen bis zu 10 Ind.
- 2006: von Anfang April bis Mitte Mai und Anfang August bis Mitte Oktober an 28 Tagen bis zu 9 Ind.
- 2007: von Anfang April bis Mitte Mai und Anfang September bis Mitte Oktober an 11 Tagen bis zu 15 Ind.

**Ringdrossel** *Turdus torquatus*

- 2003: keine Meldung
- 2004: am 7. April und am 14. September je 2 Ind.
- 2005: keine Meldung
- 2006: keine Meldung
- 2007: am 10. Oktober 3 Ind.

**Amsel** *Turdus merula*

- 2003: ganzjährig anwesend
- 2004: ganzjährig anwesend
- 2005: ganzjährig anwesend
- 2006: ganzjährig anwesend
- 2007: ganzjährig anwesend

**Wacholderdrossel** *Turdus pilaris*

- 2003: fast ganzjährig anwesend; im Januar und Oktober bis zu 100 Ind.
- 2004: ganzjährig anwesend; im Oktober bis zu 300 Ind.
- 2005: ganzjährig anwesend, im Januar bis zu 200 Ind.
- 2006: Meldungen von Ende März bis Anfang Dezember; im Oktober bis zu 150 Ind.
- 2007: ganzjährig anwesend; im Oktober bis zu 100 Ind.

**Singdrossel** *Turdus philomelos*

- 2003: im Frühling zwischen Mitte März und Mitte April und im Herbst zwischen Mitte September und Mitte November bis zu 20 Ind.
- 2004: von Anfang März bis Ende April und Anfang Juli bis Ende Oktober bis zu 40 Ind.
- 2005: eine frühe Beobachtung: 1 Ind. am 9. Januar; von Mitte März bis Ende April regelmässig bis zu 20 Ind.; ab Anfang Juni bis Anfang November wieder regelmässig bis zu 30 Ind.
- 2006: von Mitte März bis Ende April und Mitte Juni bis Ende November; maximal 80 Ind. am 25. März
- 2007: fast ganzjährig anwesend; keine Meldungen aus den Monaten Mai und Dezember

**Rotdrossel** *Turdus iliacus*

- 2003: Ende März, Anfang April und Anfang Dezember je eine Beobachtung von 1-2 Ind.
- 2004: von Ende Februar bis Anfang April und Ende Oktober bis zum Jahresende an 14 Tagen; maximal 26 Ind. am 6. November
- 2005: in der 2. Märzhälfte an 5 Tagen bis zu 4 Ind. und von Mitte Oktober bis Anfang November an 4 Tagen bis zu 35 Ind.
- 2006: von Ende März bis Mitte April an 12 Tagen; bis zu 100 Ind. am 26. März; im Oktober und November 3 Beobachtungen von 3 - 8 Ind.
- 2007: von Januar bis März an 3 Tagen und Mitte Oktober bis Ende November an 8 Tagen; bis zu 40 Ind. am 14. November

**Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

- 2003: 7 Meldungen von 1-2 Ind.; fehlt von Mai bis September
- 2004: 14 Meldungen von 1-5 Ind.; fehlt in den Monaten Mai bis August
- 2005: von Anfang Jahr bis Ende März an 8 Tagen 1-2 Ind.; eine Herbstmeldung: 2 Ind. am 7. November
- 2006: von Ende März bis Mitte April bis zu 10 Ind.; Ende Juni und Mitte Juli je 1 - 2 Ind.
- 2007: von Mitte Januar bis Mitte März und Mitte Oktober bis Mitte Dezember an 9 Tagen bis zu 4 Ind.

**Feldschwirl** *Locustella naevia*

- 2003: erste Frühjahrsbeobachtung am 24. April; regelmässig bis Anfang Juli bis zu 5 Sänger; letzte Beobachtung: 1 Ind. am 1. August
- 2004: erste Frühjahrsbeobachtung am 25. April; regelmässig bis Anfang Juli bis zu 4 Sänger; letzte Beobachtung: 1 Ind. am 22. August; eine Revierkartierung ergibt 6 Paare
- 2005: erste Frühjahrsbeobachtung am 24. April; regelmässig bis 26. Juli; bis zu 10 Sänger am 4. Mai
- 2006: erste Frühjahrsbeobachtung am 16. April; regelmässig bis Anfang Juli und vereinzelt bis Mitte August bis zu 3 Sänger; letzte Beobachtung: 1 Ind. am 27. August
- 2007: erste Frühjahrsbeobachtung am 21. April; regelmässig bis Ende Juli bis zu 5 Sänger

**Rohrschwirl** *Locustella luscinioides*

- 2003: erste Frühjahrsbeobachtung am 18. April; bis Anfang August regelmässig 1, selten 2 Sänger
- 2004: erste Frühjahrsbeobachtung am 24. April, bis Mitte August regelmässig 1, selten 2 Sänger
- 2005: erste Frühjahrsbeobachtung am 16. April; bis Mitte August meist 1, selten 2 Sänger
- 2006: erste Frühjahrsbeobachtung am 25. April; bis Ende Juni an 6 Tagen 1 - 2 Sänger; zudem 1 Ind. am 27. August
- 2007: erste Frühjahrsbeobachtung am 21. April; bis Anfang August regelmässig 1 Sänger, selten bis zu 3 Sänger

**Schilfrohrsänger** *Acrocephalus schoenobaenus*

- 2003: 3 Beobachtungen: am 9. Mai, 5. August und 10. September 1-3 Ind.
- 2004: Mitte April an 3 Tagen; Ende Juli bis Mitte September an 13 Tagen bis zu 5 Ind.
- 2005: vom 30. Juli bis 19. September an 10 Tagen 1-5 Ind.
- 2006: eine Frühjahrsbeobachtung: 1 Ind. am 27. Mai; von Mitte Juli bis Anfang Oktober an 20 Tagen meist 1 - 2 Ind., selten bis 6 Ind.
- 2007: am 15. April, 23. und 26. August und 10. Oktober je 1 Ind.

**Sumpfrohrsänger** *Acrocephalus palustris*

- 2003: nur wenige Meldungen von Mitte Mai bis Ende Juni  
2004: einige Meldungen vom 2. Mai bis Ende August; eine Revierkartierung ergibt 23 Paare  
2005: erste Frühjahrsbeobachtung am 14. Mai; bis Ende Juli regelmässig bis zu 20 Ind. (4. Juni); eine Herbstmeldung: 1 Ind. am 11. September  
2006: erste Frühjahrsbeobachtung am 8. Mai; regelmässig Meldungen bis Anfang Juli, vereinzelt bis Mitte August  
2007: vom 16. Mai bis Mitte Juli regelmässig, vereinzelt bis Ende August

**Teichrohrsänger** *Acrocephalus scirpaceus*

- 2003: vom 27. April bis Anfang Juli regelmässig Meldungen, bis Ende September noch vereinzelt  
2004: vom 21. April bis Ende Oktober regelmässig; bis zu 20 Ind. am 9. August; eine Revierkartierung ergibt 7 Paare  
2005: vom 26. April bis Mitte September regelmässig anwesend, ab Mitte Juli mehrmals bis zu 15 Ind.  
2006: vom 25. April bis Ende Juli regelmässig, vereinzelt bis Ende September; bis zu 20 Ind.  
2007: vom 21. April bis Ende Juli regelmässig, vereinzelt bis am 10. Oktober; bis zu 10 Ind.

**Drosselrohrsänger** *Acrocephalus arundinaceus*

- 2003: erste Frühjahrsbeobachtung am 4. Mai; Meldungen bis Anfang Juli von bis zu 3 Ind.  
2004: erste Frühjahrsbeobachtung am 24. April; bis Anfang Juli regelmässig bis zu 5 Ind., dann bis Mitte September noch vereinzelt Meldungen von 1 Ind.; eine Revierkartierung ergibt 5 Paare  
2005: erste Frühjahrsbeobachtung am 24. April; bis Ende August regelmässig bis zu 5 Sänger im Gebiet  
2006: erste Frühjahrsbeobachtung am 23. April; regelmässig Meldungen bis Ende August bis 4 Ind.  
2007: erste Frühjahrsbeobachtung am 18. April; regelmässig Meldungen bis Mitte Juli; vereinzelt bis Anfang September; bis zu 4 Sänger

**Gelbspötter** *Hippolais icterina*

- 2003: von Anfang Juni bis Anfang Juli an 5 Tagen 1 Ind., teils singend  
2004: von Mitte Mai bis Anfang Juli 1-2 Ind.; 1 Brut: am 27. Juni wird ein Altvogel mit Futter beobachtet  
2005: vom 1. Mai bis 6. Juli an 10 Tagen je 1 Ind.; dann am 24. August 1 Ind.; keine konkreten Bruthinweise  
2006: vom 4. Mai bis 5. September an 14 Tagen 1 - 2 Ind.; mindestens 1 Brut  
2007: vom 6. Mai bis 24. Juni an 9 Tagen 1 - 2 Ind.; am 19. Juli eine Familie mit 4 Ind.

**Orpheusspötter** *Hippolais polyglotta*

- 2003: 1 Sänger am 1. Mai (D. Marques et al.; von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission akzeptiert)  
2004: 1 Sänger am 12. Mai (H. Geisser; von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission akzeptiert)  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Klappergrasmücke** *Sylvia curruca*

- 2003: keine Frühjahrsbeobachtung; im Herbst zwischen Ende August und Anfang Oktober an 6 Tagen 1-2 Ind.  
2004: einzige Frühjahrsbeobachtung: 1 Ind. am 27. April; auf dem

- Herbstzug zwischen Mitte August und Anfang Oktober an 7 Tagen bis zu 5 Ind.  
2005: im April an 3 Tagen und Mitte August bis Ende September an 9 Tagen 1-3 Ind.  
2006: in der 2. Aprilhälfte an 3 Tagen und am 24. Mai je 1 Ind.; dann von Anfang August bis Anfang Oktober an 14 Tagen bis zu 5 Ind.  
2007: von Anfang April bis Anfang Mai an 4 Tagen und Anfang August bis Anfang September an 7 Tagen 1 - 3 Ind.

**Dorngrasmücke** *Sylvia communis*

- 2003: Anfang Mai und Ende September je 2 Beobachtungen von 1-2 Ind.  
2004: im Mai und Juni je 1 Beobachtung; im September 2 Beobachtungen von je 1 Ind.  
2005: von Mitte April bis Mitte Mai an 3 Tagen je 1 Ind.; zur Brutzeit am 7. Juni 1 Sänger; auf dem Herbstzug zwischen Mitte August und Mitte September an 3 Tagen je 1 Ind.  
2006: in der 2. Aprilhälfte an 3 Tagen 1 Ind.; 1 Sänger am 24. Mai; Ende August an 2 Tagen je 1 Ind.  
2007: im Mai an 3 Tagen teils singend und Mitte August bis Anfang September an 3 Tagen je 1 Ind.

**Gartengrasmücke** *Sylvia borin*

- 2003: Beobachtungen an 9 Tagen in der Zeit von Ende April bis Mitte September  
2004: Beobachtungen an 16 Tagen in der Zeit von Ende April bis Ende September; bis zu 3 Sänger am 22. Mai; eine Revierkartierung ergibt 5 Paare  
2005: regelmässig von Anfang Mai bis Mitte Juli; dann 2 Beobachtungen im September  
2006: Beobachtungen an 15 Tagen von Ende April bis Anfang Oktober  
2007: Beobachtungen an 22 Tagen von Ende April bis Ende Juli

**Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla*

- 2003: 27 Meldungen vom 13. April bis 2. November  
2004: 55 Meldungen vom 9. April bis 6. November; eine Revierkartierung ergibt 8 Paare  
2005: 74 Meldungen vom 4. April bis 7. November  
2006: 91 Meldungen vom 27. März bis 23. November  
2007: 71 Meldungen vom 7. April bis 13. Oktober

**Berglaubsänger** *Phylloscopus bonelli*

- 2003: keine Meldung  
2004: 1 Sänger am 28. April  
2005: 1 Ind. am 15. August  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Waldlaubsänger** *Phylloscopus sibilatrix*

- 2003: 1 Ind. am 10. September  
2004: 1 Ind. am 13. August  
2005: 1 Ind. am 27. April  
2006: keine Meldung  
2007: am 6. April 3 Ind., am 22. April und 19. August je 1 Ind.

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita*

- 2003: vom 8. März bis Ende Mai und von Mitte August bis Anfang Dezember anwesend  
2004: vom 17. März bis Ende Jahr anwesend  
2005: zwei Januarbeobachtungen; dann vom 16. März bis 11. November regelmässig anwesend

- 2006: vom 17. März bis 6. Dezember ziemlich regelmässig beobachtet; Ende März bis zu 20 Ind.  
 2007: fast ganzjährig anwesend; keine Meldungen im Juni und Dezember

**Fitis** *Phylloscopus trochilus*

- 2003: vom 9. April bis Mitte Mai regelmässig anwesend; Mitte Juni und Ende September je eine weitere Beobachtung  
 2004: vom 24. März bis Ende September an 23 Tagen; eine Revierkartierung ergibt 1 Paar  
 2005: vom 7. bis 27. April an 6 Tagen bis zu 5 Ind.; eine Brutzeitbeobachtung: 1 Ind. am 7. Juni; vom 26. Juli bis 20. September an 4 Tagen je 1-2 Ind.  
 2006: vom 31. März bis Mitte Juli regelmässig, dann bis Anfang Oktober vereinzelt  
 2007: vom 30. März bis Ende Juni regelmässig, dann bis Anfang Oktober vereinzelt

**Wintergoldhähnchen** *Regulus regulus*

- 2003: einzige Meldung: 1 Ind. am 17. Dezember  
 2004: keine Meldung  
 2005: zwischen Mitte August und Anfang November an 4 Tagen 1-3 Ind.  
 2006: im Januar, Februar und Oktober je an einem Tag 1 - 2 Ind.  
 2007: von Januar bis März an 8 Tagen und Oktober bis Dezember an 4 Tagen 1 - 3 Ind.

**Sommeregoldhähnchen** *Regulus ignicapilla*

- 2003: im März an 2 Tagen 1-2 Ind.  
 2004: 1 Ind. am 21. Oktober  
 2005: im März an 2 Tagen; im April, Juni und September je an 1 Tag jeweils 1 Ind.  
 2006: im März, Mai und Oktober an 4 Tagen je 1 Ind.  
 2007: im Januar, März, Juni und Oktober je an 1 Tag 1 Ind.

**Grauschnäpper** *Muscicapa striata*

- 2003: 7 Meldungen zwischen Ende April und Mitte September  
 2004: Anfang Mai bis Mitte September bis zu 8 Ind.; eine Revierkartierung ergibt 5 Paare  
 2005: von Anfang Mai bis Mitte September regelmässig beobachtet; bis 8 Ind. am 20. Juli  
 2006: von Ende April bis Mitte September regelmässig beobachtet  
 2007: von Mitte Mai bis Anfang Juni und Mitte Juli bis Ende August regelmässig beobachtet

**Trauerschnäpper** *Ficedula hypoleuca*

- 2003: wenige Beobachtungen im April und Ende August bis Mitte September  
 2004: Beobachtungen von Mitte April bis Mitte September; am 9. Juli 4 flügge Jungvögel  
 2005: von Anfang April bis Mitte September an 12 Tagen beobachtet  
 2006: von Mitte April bis Anfang Oktober an 23 Tagen bis zu 13 Ind.  
 2007: von Anfang April bis Ende Mai an 4 Tagen und Mitte August bis Anfang Oktober an 8 Tagen bis zu 4 Ind.

**Bartmeise** *Panurus biarmicus*

- 2003: keine Meldung  
 2004: keine Meldung  
 2005: keine Meldung  
 2006: am 8. Oktober 1 Ind.  
 2007: am 27. August 1 Ind.

**Schwanzmeise** *Aegithalos caudatus*

- 2003: von Januar bis März und September bis November  
 2004: fast ganzjährig anwesend; auffallend viele Meldungen aus den Monaten März und April; eine Revierkartierung ergibt 1 Paar  
 2005: Beobachtungen von Anfang Januar bis Anfang November; zur Brutzeit mehrmals Beobachtungen von Vögeln mit Nistmaterial; am 21. April 2 Ind. beim Nestbau  
 2006: Beobachtungen von Anfang Februar bis Ende November; im April Nestbau beim grossen Turm  
 2007: ganzjährig anwesend, mindestens 1 Brutversuch

**Sumpfmeise** *Parus palustris*

- 2003: fast ganzjährig anwesend; aus der Brutzeit keine Meldungen  
 2004: ganzjährig anwesend; eine Revierkartierung ergibt 1 Paar  
 2005: ganzjährig anwesend  
 2006: ganzjährig anwesend  
 2007: ganzjährig anwesend

**Mönchsmeise** *Parus montanus*

- 2003: keine Meldung  
 2004: 5 Ind. am 27. Juli  
 2005: 1 Ind. am 21. April  
 2006: keine Meldung  
 2007: keine Meldung

**Tannenmeise** *Parus ater*

- 2003: keine Meldung  
 2004: keine Meldung  
 2005: 2 Beobachtungen: am 14. April 2 Ind. und am 29. August 6 Ind.  
 2006: Mitte April an 2 Tagen bis zu 3 Ind.  
 2007: am 15. April mindestens 1 Ind.

**Blaumeise** *Parus caeruleus*

- 2003: ganzjährig anwesend  
 2004: ganzjährig anwesend; eine Revierkartierung ergibt 5 Paare  
 2005: ganzjährig anwesend  
 2006: ganzjährig anwesend  
 2007: ganzjährig anwesend

**Kohlmeise** *Parus major*

- 2003: ganzjährig anwesend  
 2004: ganzjährig anwesend; eine Revierkartierung ergibt 15 Paare  
 2005: ganzjährig anwesend  
 2006: ganzjährig anwesend  
 2007: ganzjährig anwesend

**Kleiber** *Sitta europaea*

- 2003: wenige Meldungen zwischen April und September  
 2004: fast ganzjährig anwesend  
 2005: fast ganzjährig anwesend  
 2006: ganzjährig anwesend  
 2007: ganzjährig anwesend

**Gartenbaumläufer** *Certhia brachydactyla*

- 2003: ganzjährig anwesend  
 2004: ganzjährig anwesend  
 2005: ganzjährig anwesend; Bruten unter anderem hinter der ProNatura-Tafel und unter dem Turmdach  
 2006: ganzjährig anwesend  
 2007: ganzjährig anwesend

**Beutelmeise** *Remiz pendulinus*

- 2003: Ende März bis Mitte April an 8 Tagen und im Oktober an 2 Tagen bis zu 6 Ind.  
2004: im April an 2 Tagen und im September und Oktober je an 1 Tag 2-3 Ind.  
2005: Ende März bis Mitte April an 8 Tagen und Ende Juli bis Mitte Oktober an 4 Tagen 1-7 Ind.  
2006: von Ende März bis Ende April an 9 Tagen und Anfang August bis Ende Oktober an 5 Tagen 1 - 4 Ind.  
2007: von Mitte März bis Anfang April an 8 Tagen und Ende September bis Anfang November an 4 Tagen 1 - 3 Ind.

**Pirol** *Oriolus oriolus*

- 2003: am 5. Juni und am 31. August je 1 Ind.  
2004: Ende Mai bis Anfang Juni an 3 Tagen und im August an 2 Tagen je 1 Ind.  
2005: 1 Sänger am 11. Mai  
2006: einzige Meldung: am 8. Juni 1 Ind.  
2007: am 24. und 27. Mai je 1 Ind. und am 27. Juni 2 Ind.

**Neuntöter** *Lanius collurio*

- 2003: im Mai und Ende Juli bis Mitte Oktober bis zu 5 Ind.  
2004: von Anfang Mai bis Ende Oktober regelmässig Beobachtungen; mindestens 1 Brut; auffallend viele (bis zu 50 Ind.) in der 2. Augushälfte  
2005: vom 30. April bis 29. September regelmässig Beobachtungen bis zu 17 Ind.; sicher 1, eventuell 2 Bruten  
2006: vom 25. April bis 21. September regelmässig Beobachtungen; bis zu 30 Ind. am 20. August; mindestens 1 Brut  
2007: vom 28. April bis 5. Oktober regelmässig Beobachtungen; mindestens 1 Brut

**Schwarzstirnwürger** *Lanius minor*

- 2003: keine Meldung  
2004: 1 Ind. am 24. Juni (K. Felix, J.-M. Obrecht, K. Robin; von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission akzeptiert)  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Raubwürger** *Lanius excubitor*

- 2003: von Anfang Oktober bis Mitte Dezember an 15 Tagen je 1 Ind., am 16. November 2 Ind.  
2004: im März an 5 Tagen und Anfang Oktober bis Ende Dezember an 15 Tagen je 1 Ind.  
2005: im Januar an 6 Tagen, Ende September und im Oktober je an 2 Tagen jeweils 1 Ind.  
2006: einzige Beobachtung: am 18. Oktober 1 Ind.  
2007: von Ende September bis Anfang November an 6 Tagen 1 - 2 Ind.

**Eichelhäher** *Garrulus glandarius*

- 2003: Meldungen von Anfang Jahr bis Anfang Mai und Ende September bis Ende Jahr; bis zu 10 Ind.  
2004: ganzjährig anwesend  
2005: ganzjährig anwesend; in den Monaten Juni bis August je nur eine Meldung; bis zu 37 Ind. am 14. April  
2006: Beobachtungen von Anfang Jahr bis Ende November  
2007: fast ganzjährig anwesend

**Elster** *Pica pica*

- 2003: ganzjährig anwesend; bis zu 20 Ind.  
2004: ganzjährig anwesend; bis zu 21 Ind.  
2005: ganzjährig anwesend; bis zu 51 Ind. am 4. Dezember  
2006: ganzjährig anwesend; im Januar bis zu 70 Ind. am Schlafplatz in den Büschen des Entensees  
2007: ganzjährig anwesend; im Januar bis zu 85 Ind. am Schlafplatz

**Dohle** *Corvus monedula*

- 2003: im März an 2 Tagen und im Herbst an 3 Tagen bis zu 17 Ind.  
2004: Anfang April und Ende Juni 1-3 Ind.; 98 Ind. am 15. Oktober  
2005: Ende März an 2 Tagen, dann im Juni und Oktober an je einem Tag 1-10 Ind.  
2006: am 25. März 7 Ind.  
2007: am 6. Oktober 1 Ind.

**Saatkrähe** *Corvus frugilegus*

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: ca. 500 Ind. am 6. Oktober  
2006: am 24. Oktober ca. 50 Ind.  
2007: Ende April, Ende Oktober und Anfang November je an einem Tag; maximal 50 Ind. am 28. Oktober

**Rabenkrähe** *Corvus corone*

- 2003: ganzjährig anwesend; bis zu 160 Ind.  
2004: ganzjährig anwesend; bis zu 500 Ind. am 5. September  
2005: ganzjährig anwesend; bis zu 120 Ind.  
2006: ganzjährig anwesend; bis zu 100 Ind.  
2007: ganzjährig anwesend; bis zu 100 Ind.

**Kolkrabe** *Corvus corax*

- 2003: mehrmals bis zu 4 Ind.  
2004: zwischen März und Oktober an 11 Tagen bis zu 3 Ind., eine Brut in einem Mast unter einem Storchenhorst nahe der Grynau  
2005: zwischen Ende März und Mitte November an 25 Tagen bis zu 6 Ind. (2 Altvögel mit 4 Jungen am 7. Juni): wieder eine Brut unter dem Storchennest nahe der Grynau  
2006: zwischen Mitte März und Ende Oktober ziemlich regelmässig Meldungen; wieder eine Brut unter dem Storchennest  
2007: ganzjährig anwesend; erneut eine Brut unter dem Storchennest

**Star** *Sturnus vulgaris*

- 2003: 2 Januarbeobachtungen; regelmässig von Anfang März bis Ende November, zum Teil übernachteten Tausende im Schilf  
2004: ganzjährig anwesend; bis zu 2000 übernachteten im Schilf  
2005: ganzjährig anwesend; ca. 5000 Ind. am 26. August  
2006: regelmässig von Mitte März bis Ende November; ca. 4000 Ind. Anfang August  
2007: von Mitte Januar bis Anfang Dezember; ca. 2000 Ind. Anfang März

**Hausperling** *Passer domesticus*

- 2003: wenige Beobachtungen  
2004: einige Beobachtungen  
2005: einige Beobachtungen vor allem im angrenzenden Siedlungsgebiet  
2006: von Januar bis Oktober 14 Beobachtungen  
2007: ganzjährig anwesend; 28 Beobachtungen

**Feldsperling** *Passer montanus*

- 2003: fast ganzjährig anwesend; bis zu 50 Ind. zusammen  
2004: ganzjährig anwesend; bis zu 80 Ind. zusammen; eine Revierkartierung ergibt 10 Paare  
2005: ganzjährig anwesend; bis zu 200 Ind. am 15. August  
2006: regelmässig von Ende Januar bis Ende November; bis zu 50 Ind. Ende Juli  
2007: ganzjährig anwesend; bis zu 200 Ind. Ende Juli

**Buchfink** *Fringilla coelebs*

- 2003: ganzjährig anwesend  
2004: ganzjährig anwesend; eine Revierkartierung ergibt 18 Paare  
2005: ganzjährig anwesend; am 6. Oktober ca. 2000 Ind.  
2006: ganzjährig anwesend  
2007: ganzjährig anwesend; bis zu 1000 Ind. am 10. Oktober

**Bergfink** *Fringilla montifringilla*

- 2003: keine Meldung  
2004: von Mitte September bis Ende Jahr an 4 Tagen 1-5 Ind.  
2005: von Mitte Februar bis Mitte März und Mitte Oktober bis Anfang November an 7 Tagen bis zu 20 Ind.  
2006: von Ende März bis Anfang April an 3 Tagen 2 - 4 Ind.  
2007: im Oktober an 3 Tagen 1 - 2 Ind.

**Girlitz** *Serinus serinus*

- 2003: Ende März bis Mitte Mai an 3 Tagen je 1 Ind.  
2004: zwischen Ende April und Mitte Oktober an 4 Tagen 1-2 Ind.  
2005: von Mitte März bis Ende August und im Oktober an 13 Tagen meist 1-2 Ind., am 3. Oktober 9 Ind.  
2006: zwischen Ende April und Anfang August an 5 Tagen bis zu 5 Ind.  
2007: zwischen Ende Februar und Anfang Oktober an 11 Tagen bis zu 6 Ind.

**Grünfink** *Carduelis chloris*

- 2003: im März, April und September bis November Beobachtungen bis zu 14 Ind.  
2004: fast ganzjährig anwesend; bis zu 75 Ind.  
2005: fast ganzjährig anwesend  
2006: fast ganzjährig anwesend; bis zu 40 Ind.  
2007: ganzjährig anwesend; bis zu 70 Ind.

**Distelfink** *Carduelis carduelis*

- 2003: von Mitte März bis Ende Jahr an 12 Tagen 1-2 Ind.  
2004: von Mitte März bis Mitte November regelmässig; bis zu 80 Ind. Mitte August; eine Revierkartierung ergibt 3 Paare  
2005: von Ende März bis Anfang November regelmässig anwesend; maximal 60 Ind. am 17. August  
2006: von Ende März bis Anfang Dezember; im August bis zu 40 Ind.  
2007: ganzjährig anwesend; im August bis zu 60 Ind.

**Erlenzeisig** *Carduelis spinus*

- 2003: einzige Frühjahrsbeobachtung: 3 Ind. am 12. April; Ende Oktober bis Mitte Dezember an 6 Tagen bis zu 47 Ind.  
2004: am 11. Januar 8 Ind.; im Spätherbst an 11 Tagen bis zu 150 Ind.  
2005: von Anfang Jahr bis Ende März an 7 Tagen und Ende September bis Ende Jahr an 9 Tagen bis zu 100 Ind. (6. Oktober)  
2006: im Februar, April, Oktober und November an 7 Tagen bis zu 50 Ind.  
2007: von Anfang Jahr bis Mitte April an 8 Tagen und Ende September bis Mitte Dezember an 19 Tagen bis zu 50 Ind.

**Hänfling** *Carduelis cannabina*

- 2003: im April, November und Dezember je eine Beobachtung von 1-6 Ind.  
2004: im August, Oktober und November je eine Beobachtung von 3-8 Ind.  
2005: Mitte März und Ende April je eine Beobachtung von 1 Ind.  
2006: im März, Oktober und November je eine Beobachtung mit 1 - 8 Ind.  
2007: einzige Beobachtung: am 9. März 1 Ind.

**Alpenbirkenzeisig** *Carduelis cabaret*

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: keine Meldung  
2006: von Mitte März bis Mitte April an 12 Tagen bis zu 8 Ind.  
2007: am 2. November 8 Ind.

**Gimpel** *Pyrrhula pyrrhula*

- 2003: im Januar und Februar an 4 Tagen bis zu 6 Ind.  
2004: im November und Dezember an 4 Tagen bis zu 5 Ind.  
2005: von Anfang Jahr bis Ende März und Anfang November bis Ende Jahr an 17 Tagen bis zu 16 Ind.; am 13. und 16. März und am 27. November jeweils 1-2 Trompetergimpel  
2006: von Januar bis März an 6 Tagen und eine Augustbeobachtung, 1 - 6 Ind.  
2007: keine Meldung

**Kernbeisser** *Coccothraustes coccothraustes*

- 2003: Januar bis April und Oktober bis Dezember an 8 Tagen 1-6 Ind.  
2004: an 15 Tagen bis zu 40 Ind.  
2005: in den Monaten Januar bis März, September, November und Dezember an 7 Tagen bis zu 14 Ind.  
2006: in den Monaten März, April, Juni, August und Dezember an 6 Tagen bis zu 20 Ind.  
2007: in den Monaten Januar bis März und November bis Dezember an 17 Tagen bis zu 31 Ind.

**Goldammer** *Emberiza citrinella*

- 2003: keine Meldung  
2004: 1 Ind. am 17. April  
2005: am 26. Mai 2 Sänger, dann am 6. und 27. Juni je 1 Ind.  
2006: keine Meldung  
2007: am 20. Oktober 1 Ind.

**Zaunammer** *Emberiza cirulus*

- 2003: keine Meldung  
2004: am 27. März und 27. April je 1 Ind.  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung

**Zippammer** *Emberiza cia*

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: keine Meldung  
2006: keine Meldung  
2007: am 10. Oktober 1 Ind.

**Ortolan** *Emberiza hortulana*

- 2003: am 30. April 1 Ind. und am 10. September 4 Ind.  
2004: am 4. Mai 2 Ind. und am 14. September 1 Ind.  
2005: 1 Ind. am 14. April  
2006: am 24. Oktober 1 Ind.  
2007: am 28. April 1 Ind. und am 9. August 2 Ind.

**Rohrammer** *Emberiza schoeniclus*

- 2003: fast ganzjährig anwesend; zur Zugzeit bis zu 30 Ind.  
2004: von Ende Februar bis Ende November; zur Zugzeit bis zu 80 Ind. zusammen; eine Revierkartierung ergibt 8 Paare  
2005: am 1. Januar 2 Ind., dann von Ende Februar bis Mitte November regelmässig bis zu 20 Ind.  
2006: von Ende Februar bis Ende November; im März bis zu 80 Ind.  
2007: von Ende Januar bis Anfang November; Ende April bis zu 40 Ind.

**Graurammer** *Emberiza calandra*

- 2003: am 19. März 2 Ind., am 30. April und 2. Oktober je 1 Ind.  
2004: keine Meldung  
2005: 2 Beobachtungen: am 14. April 1 Sänger und am 20. Oktober 1 Ind.  
2006: am 26. Mai, 29. Juni und 18. Oktober je 1 Ind.  
2007: am 21. Februar 1 Ind.

**Halsbandsittich** *Psittacula krameri* (aus Käfighaltung entkommen?)

- 2003: keine Meldung  
2004: keine Meldung  
2005: 1 Ind. am 29. September  
2006: keine Meldung  
2007: keine Meldung